


BERTORELLA

GGD

Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** bertorella
fr motelle de Méditerranée
en shore rockling



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	M	H
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 60 cm

Caracteres más significativos

Especie de cuerpo alargado, casi cilíndrico en su parte anterior. Su longitud más común se encuentra entre 9 y 20 cm.

Cabeza puntiaguda y estrecha, más que la de *Gaidropsarus mediterraneus* (bertorella). Ojos pequeños y boca amplia, que alcanza el borde posterior del ojo. Mandíbula inferior algo más corta que la superior. Tiene como carácter principal tres largos barbillones, dos nasales y uno en el extremo de la mandíbula inferior.

Presenta dos aletas dorsales. La primera que es muy corta, está formada por un radio alargado seguido de muchos radios cortos y finos. La segunda aleta dorsal, al igual que la aleta anal, es larga, y está formada por radios bastante largos y regulares. Las aletas pectorales son amplias y su extremo excede el origen de la segunda dorsal. Aleta caudal redondeada. Esta especie no posee radios espinosos en sus aletas.

Especies con caracteres semejantes

Gaidropsarus vulgaris (lota)


Molva molva (maruca)

Nombres Comerciales y Locales

Asturias	barbada, guaita
Baleares	mollareta, móllera, móllera gorda, móllera inglesa, mollereta, mortell
Cantabria	barbada, barbara de roca, barborada, guaita, guaito, madre de la anguila, mollera
Cataluña	capellá, fura, fura blanca, fura negra, guineu, móllera borda, móllera gorda, móllera moranella, palayo, pelayo
Com. Valenciana	capellá, capellán, guineu, móllera roquera
Galicia	barbada, barbada da pedra, barbada de area, barborada, faneca barbuda, guaita, locha, móllera
Murcia	capellá, capellán, guineu, móllera roquera
País Vasco	aholatz, aholatza, aolatz, lechera, letxera, muxarra, pospolu

Descripción General

Cuerpo con coloración pardo rojiza con pequeñas bandas transversales y manchas claras sobre el dorso y la cabeza. El vientre es de coloración más clara. Todo el cuerpo, incluidas las aletas, posee numerosas manchas oscuras y claras de diverso tamaño. Las aletas dorsales y la anal están bordeadas de un tono oscuro.



Línea lateral poco visible e interrumpida. Los barbillones tienen una función sensorial.

Hábitat y comportamiento



Especie de hábitos típicamente bentónicos. Habita fondos rocosos de la zona litoral, desde la línea de costa hasta los 60 m de profundidad, aunque puede sobrepasar los 300 m. Los juveniles

viven entre las algas de los fondos rocosos litorales.

Es omnívoro. Se alimenta de pequeños crustáceos, poliquetos y algas en sus estados más jóvenes, y a medida que crece, aumenta la proporción de cangrejos, gambas y pequeños peces en su dieta.

Distribución



Se distribuye por el Atlántico este, desde Noruega hasta la costa noroeste de África, así como en el mar Mediterráneo y el mar Negro.

Reproducción

La puesta se realiza desde otoño a primavera en el Mediterráneo y mar Negro, mientras que en el Atlántico tiene lugar de primavera a verano.

Los huevos y las larvas son pelágicos.

El crecimiento es moderadamente rápido: alcanzan 10 cm al final del primer año y 30 cm a los 6 años.

Artes de Pesca

Se captura, con artes de arrastre y palangre de fondo, redes de enmalle y nasas, como especie accesoria de otras pesquerías.

Comercialización

Es una especie apreciada por su carne, pero no es habitual encontrarla en los mercados. Se comercializa fresca. También se utiliza para hacer harina de pescado.

Para alargar la conservación de la carne, conviene eviscerarla nada más pescarla. Se desembarca principalmente fresco y eviscerado.

