



# LOTA GGU

*Gaidropsarus vulgaris* (Cloquet, 1824)



Orden: Gadiformes - Familia: Lotidae

Nombres **FAO**: **es** mollareta  
**fr** motelle commune  
**en** three-bearded rockling



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	M	H
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 60 cm

## Caracteres más significativos

Especie de cuerpo alargado, casi cilíndrico. La longitud más común de esta especie se encuentra entre 9 y 20 cm.

Cabeza puntiaguda y estrecha, aunque menos que la de *Gaidropsarus mediterraneus* (bertorella). Ojos pequeños y boca amplia, que alcanza el borde posterior del ojo. Mandíbula inferior algo más corta que la superior. Destacan los tres largos barbiliones que desarrolla, dos nasales y uno en el extremo de la mandíbula inferior.

Tiene dos aletas dorsales. La primera es muy corta, de longitud similar al diámetro del ojo, y con el primer radio alargado; el

resto son filamentos carnosos, cortos e independientes. La segunda dorsal y la aleta anal son muy largas y llegan hasta el inicio del pedúnculo caudal. Las aletas pectorales son amplias y su extremo excede el origen de la segunda dorsal. La cola es ancha, con el borde posterior redondeado. No posee espinas en ninguna de sus aletas.

### Especies con caracteres semejantes

*Gaidropsarus mediterraneus* (bertorella)


*Molva molva* (maruca)

## Nombres Comerciales y Locales

Asturias	cabriella, lechera
Cantabria	barbara, madreanguila
Cataluña	fura de taques
Galicia	barbada común, marela, mariola
Murcia	bocadulce
País Vasco	aholatz hirubixar, aingira bizarra, letxera

## Descripción General

Coloración pardo-rojiza con pequeñas bandas transversales; posee manchas oscuras sobre el dorso y la cabeza. El vientre es de coloración más clara. Las aletas dorsales y la anal pueden tener manchas oscuras y claras de diferente tamaño y están bordeadas por un tono rosáceo. Línea lateral visible, que se curva a la altura de la aleta pectoral y es recta en la parte posterior. Los barbillones tienen función sensorial.



## Hábitat y comportamiento



Es una especie de hábitos típicamente bentónicos. Habita aguas poco profundas, de 10 a 450 m de profundidad, en fondos de sustratos rocosos, aunque también pueden encontrarse en fondos blandos de arena, fango o grava.

Se alimenta de pequeños crustáceos y poliquetos en sus estadios más jóvenes, y a medida que crece, aumenta la proporción de cangrejos, gambas y pequeños peces en su dieta.

## Distribución



Se distribuye por el Atlántico noreste, desde las costas centrales de Noruega hasta el norte de África. Asimismo, se encuentra en la costa occidental del Mediterráneo.

## Reproducción

Realizan la puesta durante la primavera y el verano. Los huevos y las larvas son pelágicos y, generalmente, se sitúan en aguas superficiales. Cuando alcanzan pocos cm las larvas se asientan en el fondo, muy cerca de la costa, y adquieren una coloración muy oscura hasta que tienen varios meses de edad. Entonces adquieren las tonalidades de los adultos. El crecimiento es rápido: alcanzan 18 cm al final del primer año y 36 cm a los 6 años.

## Artes de Pesca

Es una especie típica de by-catch. No existe una pesca dirigida hacia ella. Aparece en arrastres de fondo, así como en palangres y nasas.

## Comercialización

Es una especie apreciada por su carne, pero no es habitual encontrarla en mercados. Se comercializa fresco.

