

PEJERREY


ATB

Atherina boyeri (Risso, 1810)



Orden: Atheriniformes - Familia: Atherinidae

Nombres **FAO**: **es** pejerrey mediterráneo
fr joël
en big-scale sand smelt



| Talla (cm) | Caladeros | | | Talla de Maduración Sexual (cm) | |
|------------|-----------|-----|-----|---------------------------------|---|
| | CANT Y W | MED | CAN | M | H |
| mínima | - | - | - | | |
| comercial | - | - | - | 4-6 | |

UICN: DD

LONGITUD MÁXIMA: 13 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, cilíndrico, delgado y ligeramente comprimido. Talla media de 10 cm. Aspecto escamoso. Muestra una banda iridiscente (oscura en los ejemplares conservados) a lo largo de cada flanco del cuerpo.

Cabeza ligeramente aplanada. Ojos relativamente muy grandes, que ocupan la mayor parte de la cabeza y cuyo diámetro es mayor que la longitud del hocico. Boca oblicua grande y protractil. La parte horizontal del premaxilar es de tamaño similar o algo más larga que la rama vertical.

No posee una verdadera línea lateral pero el número de escamas de la banda lateral es útil para diferenciar las diferentes especies, que son muy similares.

Presenta dos aletas dorsales separadas y con radios visibles. La primera aleta dorsal se sitúa algo por detrás de la aleta ventral y consta de 6-9 espinas. La segunda dorsal tiene su origen en la vertical de la anal y posee 1-2 radios espinosos y 8-14 radios blandos. La aleta anal presenta sólo 1 espina y 13-16 radios blandos. Aleta caudal escotada.

Especies con caracteres semejantes:


Atherina presbyter (abichón)
Atherina hepsetus (chucleto)

Nombres Comerciales y Locales

| | |
|-----------------|---|
| Andalucía | pejerrey |
| Baleares | cabessuda, cesklet, mochó, mochón, moixó, moixi, moixonet, moxó, muchó, muixó |
| Cantabria | chiflete, pez sin sangre, pion, sula |
| Castilla | mochón, pejerrey |
| Cataluña | cabecuda, joell, jovell, moixó, moixonet, peix sense sang, xanquet |
| Com. Valenciana | joell, mochó, mochón, moixó, moixonet, peixe sense sang, platero, rey |
| Galicia | peón, pialla, piarda, piarda do mediterraneo, piolla, pión |
| Murcia | chirrete (juveniles) |
| País Vasco | abichón, abixoi txiki, abixoi txikia |

Descripción General

Coloración poco aparente, casi translúcida con el dorso beige o verdoso y los flancos y la zona ventral son de color plateado iridiscente. Posee una banda lateral plateada, oscura por abajo y brillante por arriba, que recorre la parte media del cuerpo desde la parte posterior del opérculo a la cola. Los márgenes de las escamas presentan una coloración oscura.



Escamas relativamente grandes y cicloideas, que se organizan en líneas de menos de 44-49 unidades.

La mandíbula inferior presenta una prolongación ósea, que se proyecta hacia el interior de la boca, armada con dientes menudos. La prolongación ósea es dentada, a diferencia de las de otras especies del mismo género en las que no lo es.

Hábitat y comportamiento



Especie frecuente en aguas litorales. Tiene preferencia por las aguas salobres y de baja densidad, por lo que suele encontrarse en lagunas litorales y en estuarios viviendo cerca del fondo o

en zonas abrigadas a poca profundidad (puertos, calas, etc.). Existen poblaciones fijas tierra adentro en Italia, Francia y Egipto.

Tiene un marcado carácter gregario y forma bancos muy numerosos.

Su dieta puede variar mucho en función del medio en el que vive. Se alimenta de organismos de pequeño tamaño: básicamente de zooplancton y pequeños invertebrados bentónicos, e incluso puede comer insectos y sus larvas.

Distribución



Se distribuye por el litoral Mediterráneo y el mar Negro. En el Atlántico, su distribución va de España y Portugal a Mauritania y Madeira. Existen algunas poblaciones aisladas a lo largo de la costa sur de Inglaterra y los Países Bajos.


Reproducción

Alcanzan la madurez sexual cuando tienen un año de vida. La reproducción se produce desde el invierno hasta mediados del verano.

Los huevos son bentónicos y se fijan a algas y rocas mediante unos filamentos.

Tiene un crecimiento muy rápido y alcanza una edad máxima de 3 años.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura ocasionalmente al cerco y, junto con las otras especies, con artes específicos como la moixonera en el Levante español.

Comercialización

Especie con baja importancia económica que se consume como morralla y también es utilizada como carnaza. Las distintas especies del género se venden y consumen juntas.

Se desembarcan frescos y enteros.

