



ABICHÓN

ATP

Atherina presbyter (Cuvier, 1829)



Nombres **FAO**: **es** abichón, chirrete
fr prôte
en sand smelt



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)
	CANT Y W	MED	CAN	
mínima	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 20 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, delgado y ligeramente comprimido. Talla media de 12-16 cm. Aspecto escamoso. Muestra una banda iridiscente poco conspicua (oscura en los ejemplares conservados) a lo largo de cada flanco del cuerpo.

Cabeza ligeramente aplanada. Ojos grandes, cuyo diámetro mide lo mismo que el hocico. Boca oblicua grande, protráctil. La rama horizontal del premaxilar es de una longitud similar a la horizontal.

No posee una verdadera línea lateral pero el número de escamas de la banda lateral es útil para diferenciar las diferentes especies, que son muy similares.

Presenta dos aletas dorsales separadas, ambas con forma triangular y con radios visibles. La primera aleta dorsal se sitúa un poco por detrás de la aleta ventral y consta de 7-9 espinas. La segunda dorsal tiene su origen en la vertical de la anal y posee un primer radio espinoso y 11-13 radios blandos. La aleta anal presenta una espina y 13-16 radios blandos. Aleta caudal escotada.

Especies con caracteres semejantes:

Atherina hepsetus (chucleto)


Atherina boyeri (pejerrey)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	choclé, pejerrey, pez de plata
Asturias	aguacioso, mirloto, mirloto, mirlotu, pejerrey, piolla, pión, sugla
Baleares	cabasuda, cabessuda, cabesuda, cabusade
Canarias	guelde, longoron, suelde
Cantabria	abichón, aguacioso, pez sin sangre, piolla, pión, sula
Castilla	abichón, peje rey, pez de rey, sula
Cataluña	cabessut, joell
Com. Valenciana	chirrete, Jeclét, juclét, moixó, moixonet, xuclet
Galicia	aguacioso, bogón, corcón, peón, piolla, piarda, piobardo, piolla, pión
Murcia	chirrete
País Vasco	abichón, abixoi handia

Descripción General


Coloración del cuerpo casi translúcida, con el dorso plateado verdoso y los laterales y la zona ventral de color plateado iridiscente. Posee una banda lateral plateada que recorre la parte media del cuerpo desde la parte posterior del opérculo hasta la cola; es poco conspicua (menos que la de *A. boyeri*) y posee una línea superior de un brillante color verde o azulado. Los márgenes de las escamas presentan una coloración oscura.



Escamas de pequeño tamaño que se organizan en líneas de entre 52 y 57 unidades.

La mandíbula inferior presenta una prolongación ósea que se proyecta hacia el interior de la boca. La prolongación ósea no es dentada, a diferencia de *A. boyeri* en la que sí que lo es.

Hábitat y comportamiento



Especie frecuente en aguas litorales someras y resguardadas, preferentemente sobre fondos de arena. Frecuente en puertos y estuarios, en los que puede penetrar en las aguas salobres.

Tiene un marcado carácter gregario.

Se alimenta de organismos crustáceos planctónicos y larvas de peces

Distribución




Presente desde Escandinavia (estrecho de Kattegat) hasta Marruecos y en las islas de Madeira, Canarias y Azores. Se ha detectado su presencia en algunos puntos del Mediterráneo occidental.

Reproducción

Se reproduce de abril a julio y los huevos presentan numerosos filamentos con los que se fijan a las algas o piedras del fondo.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura ocasionalmente al cerco y, junto con las otras especies, con artes específicos como la moixonera en el Levante español.

Comercialización

Especie con baja importancia económica que se consume como morralla y también utilizada como carnaza. Las distintas especies del género se venden y consumen juntas. Se desembarcan frescos y enteros.

