



# SALMONETE REAL

APO

*Apogon imberbis* (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** salmonete real  
**fr** castagnole rouge  
**en** cardinal fish



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 15 cm

## Caracteres más significativos

Especie de cuerpo corto y ovalado, más bien comprimido. De pequeña talla, normalmente su longitud oscila entre los 10 y los 12 cm.

La cabeza y los ojos son muy grandes en relación con la talla del pez. El borde del preopérculo está finamente aserrado. La boca es grande y oblicua, y en ella las mandíbulas se sitúan de manera que la inferior sobrepasa levemente a la superior.

Presenta dos aletas dorsales bien diferenciadas; la primera está compuesta por 6 espinas y la segunda por 1 espina y 9-10 radios blandos. La aleta anal está constituida por 2 radios duros y 8 o 9 radios blandos. Las aletas pectorales son redondeadas y largas y sobrepasan la altura de inicio de la aleta anal.

Especies con caracteres semejantes

*Epigonus constanciae*

*Epigonus denticulatus*


*Epigonus telescopus* (tomás)

## Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	bodión de limpio, castañuela colorá, reyezuelo
Baleares	cañavieja roja, escania veyá, escanya veyá, escañas veyas, mare d'anfós, moret vermey, muret vermell, muret vermey, sa mare d'anfós
Canarias	alfonsiño, fucinita, peje rey
Cataluña	anfós, escanyavelles, mare d'anfós, mare del moll, moll regal, moll reial, moret vermell, rei, reiet, rey, reyet, roiger
Com. Valenciana	roiger

## Descripción General

El color de este pez es rojo anaranjado muy vivo y uniforme, algo más oscuro en el dorso y en la cabeza que en el resto del cuerpo. Los ojos son negros, y se hallan atravesados por dos líneas horizontales de color claro. Los bordes de las aletas dorsal y anal suelen ser también más oscuros. En ocasiones en la base de la aleta caudal se distinguen 2 o 3 manchas negras, de tamaño muy pequeño, que pueden unirse y aparecer como una única mancha.



El cuerpo está cubierto en su totalidad de escamas ctenoideas. La línea lateral es completa y está cubierta por 22-30 de estas escamas.

Sobre las dos mandíbulas, los palatinos y el vómer se sitúan dientes viliformes de pequeño tamaño.

## Hábitat y comportamiento



Especie bentónica y típicamente litoral. Vive a poca profundidad; por lo general no supera los 30 m. Realiza migraciones estacionales, dirigiéndose en invierno a fondos fangosos situados a una profundidad máxima de 200 m.

Puede encontrarse tanto en solitario como formando grupos de pequeño tamaño. Es activa durante la noche, y pasa el día en el interior de cuevas y anfractuosidades rocosas poco iluminadas. Durante la noche abandona su resguardo para alimentarse; su dieta se compone de pequeños invertebrados, crustáceos y peces.

## Distribución



En la costa este del océano Atlántico, desde las costas de Portugal hasta las del golfo de Guinea, incluidas las islas Azores. Se encuentra también en todo el mar Mediterráneo, siendo especialmente abundante en las zonas más cálidas y en la parte noroccidental.

## Reproducción

Se reproduce entre junio y septiembre.

La fecundación es interna. Tras ésta, los huevos permanecen pegados unos a otros mediante unos filamentos, formando una masa compacta que el padre guarda celosamente en su boca hasta el momento de la eclosión; durante este periodo de incubación, el macho deja de alimentarse.

## Artes de Pesca

No tiene interés pesquero.

## Comercialización

Sin interés comercial. Se comercializa fresca, muchas veces mezclada con otras especies de poco valor como pescado para sopa. Se desembarca fresco entero.

