


PALOMETA BLANCA

POP

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO:** **es** pámpano blanco
fr palomine
en pompano



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 80 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, alto y muy comprimido, de aspecto dorso-ventral notablemente simétrico. Tamaño medio menor a 30 cm.

El perfil anterior de la cabeza es redondeado. La cabeza es relativamente pequeña, sobre todo en grandes ejemplares. Ojos pequeños y con papila adiposa. La comisura de la boca se extiende hasta la altura de la primera mitad del ojo.

Presenta de 3 a 5 manchas características en cada flanco, sobre la línea lateral y perpendiculares a ella.

Posee dos aletas dorsales. La primera dorsal está formada por 6 espinas y la segunda consta de un solo radio duro y 23-27 radios

blandos. Los primeros radios de la segunda dorsal dibujan un lóbulo. Las aletas pélvicas, redondeadas y formadas por 1 solo radio duro y 5 blandos, son mucho más cortas que las pectorales. La primera aleta anal está constituida por 2 espinas muy cortas, mientras que la segunda está integrada por una sola espina unida por una membrana a los siguientes 22-25 radios blandos. Esta última aleta y la segunda dorsal tienen una longitud y una forma similar. La aleta caudal es potente, larga y muy ahorquillada, con los extremos afilados. El pedúnculo caudal es más bien fino en relación con el cuerpo.


Especies con caracteres semejantes
Pseudocaranx dentex (jurel limón)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	pámpano blanco
Baleares	palomida, palomide, palomina
Canarias	palometa
Cataluña	bairó, columida, palometa, palomida, palomida xica, sorell de penya, sorell de penye
Com. Valenciana	golfas, japuta, palometa, palomida, palomina, palomita, sorell de penye
Galicia	pampo branco
Murcia	palometa
País Vasco	itsas pochua, itsas potxu, itxas pochua, lampua, licha

Descripción General

El color del dorso es gris verdoso o gris azulado y la superficie ventral y los flancos son de color blanco nacarado brillante. En los flancos tiene 3-5 características manchas negras. Las puntas de los lóbulos de la segunda dorsal y de la segunda anal y los extremos de la aleta caudal, son negros. Escamas pequeñas cicloideas distribuidas por todo el cuerpo. La línea lateral no presenta escamas modificadas ni grandes desviaciones, es casi recta; consta de 120-127 escamas. La boca está provista de una franja de numerosos dientes pequeños que se estrechan hacia atrás en cada mandíbula.



Hábitat y comportamiento



Especie pelágica, buena nadadora, que se reúne en pequeños grupos a muy poca profundidad, en la zona de rompientes de las playas o en su inmediatez. Los adultos y juveniles forman cardúmenes cerca de la superficie en zonas de playa de arena. Los juveniles también pueden verse formando bancos en el interior de los puertos y nadando en grupos bajo la umbrela de las medusas, donde encuentran protección entre sus tentáculos urticantes; a la vez, aprovechan los restos de las presas ingeridas por las medusas o incluso filamentos y gónadas de las medusas. Se alimenta de peces, crustáceos y otros invertebrados tanto bentónicos como planctónicos. Los juveniles son muy voraces y comen básicamente crustáceos planctónicos, sobre todo copépodos, pero también foraminíferos bentónicos y hasta insectos terrestres.

Los juveniles también pueden verse formando bancos en el interior de los puertos y nadando en grupos bajo la umbrela de las medusas, donde encuentran protección entre sus tentáculos urticantes; a la vez, aprovechan los restos de las presas ingeridas por las medusas o incluso filamentos y gónadas de las medusas. Se alimenta de peces, crustáceos y otros invertebrados tanto bentónicos como planctónicos. Los juveniles son muy voraces y comen básicamente crustáceos planctónicos, sobre todo copépodos, pero también foraminíferos bentónicos y hasta insectos terrestres.

Distribución



Su distribución se restringe al Atlántico oriental desde Escandinavia y las islas Británicas, donde es más bien raro, hasta Angola, incluido el golfo de Vizcaya. En el Mediterráneo es frecuente sobre todo en la cuenca meridional, aunque en los últimos años ha aparecido en zonas en la que era prácticamente desconocido


(Adriático, Mediterráneo noroccidental) debido al progresivo calentamiento de las aguas.

Reproducción

La reproducción tiene lugar cerca de la costa durante el verano. Huevos y larvas pelágicos, se encuentran entre aguas, sin ligarse a ningún sustrato.

Puede llegar a medir hasta 80 cm y pesar 2,8 kg.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

En pesca profesional se captura como especie accesoria de otras pesquerías de arrastre, palangre, curricán y artes de enmalle.

Los pescadores deportivos la estiman y capturan los mayores ejemplares al curricán ligero, con caña y flotador desde la costa, o a mosca.

Comercialización

Su carne es sabrosa y se comercializa en fresco y congelado, pero es poco apreciada y carece de importancia económica.

La forma más habitual de desembarco y comercialización es entero y fresco, pero también puede ser procesado a bordo y conservado en congelador.

