



PEZ DE LIMÓN

AMB

Seriola dumerili (Risso, 1810)



Nombres **FAO**: **es** pez de limón
fr sériole couronnée
en greater amberjack



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	75-80	
comercial	-	-	-		

LONGITUD MÁXIMA: 200 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo muy hidrodinámico, fusiforme y levemente comprimido. El perfil anterior de la cabeza es redondeado. Normalmente no sobrepasa los 40 cm.

La cabeza es grande. La boca es ancha; las comisuras alcanzan la vertical del centro del ojo. Posee un supramaxilar tan ancho como el diámetro del ojo y ambas maxilas están dotadas de pequeños dientes.

Tiene unas características bandas doradas que atraviesan oblicuamente los ojos y tienden a converger hacia la nuca.

Posee dos aletas dorsales. La primera es más corta y está formada por 7 espinas poco desarrolladas; el primer radio está tumbado hacia delante. La segunda dorsal tiene una sola espina y 29-35 radios blandos; los radios de

la parte delantera están más desarrollados y forman un lóbulo puntiagudo. También posee dos aletas anales. La primera se compone de 2 radios espinosos poco desarrollados, y la segunda tiene 1 solo radio duro y 18-22 radios blandos. La segunda anal es más corta que la segunda dorsal y, al igual que ésta, los primeros radios están más desarrollados y forman un lóbulo de longitud parecida a la de la aleta pectoral. El pedúnculo caudal es estrecho y en los adultos presenta una quilla ósea a cada lado y dos surcos transversales, uno dorsal y otro ventral. La aleta caudal es potente y marcadamente ahorquillada.

Especies con caracteres semejantes

Seriola fasciata (medregal listado)


Seriola rivoliana (medregal limón)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	lecha, pez limón, serviola
Baleares	cirvia, cirviola, pez limón, serviola, sirvia, sirviola, verderol
Canarias	limón, medregal
Cataluña	cèrvia, cerviola, círvia, cirviola, dorado, letja, palomida, sèrvia, serviola sírvia, sorella, verderol, xola
Com. Valenciana	cèrvia, lechola, letxa, seriola, seriola dumerili, verderol
Galicia	peixe limán
Murcia	lecha
País Vasco	seriola

Descripción General

El color del pez de limón es variable según la edad del ejemplar. Los adultos presentan un color oliva en el dorso, los flancos son más claros con brillos plateados y el vientre es blanco metalizado. Son características las bandas doradas que atraviesan oblicuamente los ojos y tienden a converger hacia la nuca. Los juveniles pueden exhibir unas anchas y oscuras bandas verticales, aunque sólo cuando se hallan excitados. Los alevines son de color amarillo y siempre presentan estas bandas.



Cuerpo cubierto de pequeñas escamas cicloideas. Línea lateral arqueada, siguiendo el perfil dorsal del pez, y formada por escamas no modificadas. La primera espina de la primera aleta dorsal se encuentra recubierta por tejido epitelial en los ejemplares grandes.

Los dientes, presentes en ambas mandíbulas, son muy pequeños y se disponen en una franja delantera ancha y una banda posterior.

Hábitat y comportamiento




Especie nectónica que habita en la plataforma entre 50 y 150 m de profundidad. En primavera migra hacia aguas costeras para reproducirse y pasar el verano.

Los juveniles se encuentran agregados bajo objetos flotantes, en donde permanecen de 3 a 5 meses, hasta que alcanzan los 35 cm y abandonan estos refugios y se vuelven decididamente epibentónicos de hábitos costeros. Hasta

los dos años de edad se mantienen cerca de la costa, a poca profundidad y se mantienen agrupados formando bancos ocasionalmente densos o nadan en solitario mezclándose con otras especies (medusas o bancos de salemas (*Salpa salpa*)).

El pez de limón es un buen nadador y alcanza grandes velocidades. Especie básicamente ictiófaga que se alimenta de peces que nadan entre aguas, como la boga (*Boops boops*), la sardina (*Sardinia pilchardus*) o la alacha (*Sardinella aurita*), entre otras muchas especies. Complementa la dieta con moluscos cefalópodos.

Distribución



Es una especie común en el Mediterráneo. En el Atlántico oriental, se encuentra desde las islas Británicas hasta las costas de Marruecos. En el Atlántico occidental se encuentra desde Canadá

hasta Brasil, incluido el golfo de Méjico y el Caribe. Presente en el océano Índico (de Sudáfrica al golfo Pérsico) y el Pacífico occidental (Japón, Hawaii).


Reproducción

El pez de limón tiene los sexos separados y se reproduce a finales de primavera y comienzo del verano, cerca de la costa. Huevos y larvas quedan a merced de las corrientes hasta que los jóvenes se asientan en diversos objetos flotantes, en donde permanecen de 3 a 5 meses.

Maduran entre los 4 y 5 años, cuando miden entre 75 y 80 cm y pesan alrededor de los 8 kg.

El crecimiento es muy rápido: en seis meses pueden llegar a medir hasta 40 cm; los ejemplares de mayor tamaño pueden llegar a medir 2 m de longitud y superar los 80 kg de peso.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura mediante palangres flotantes o al curricán de fondo con cebo vivo (normalmente un calamar). En el Mediterráneo la moruna es una práctica habitual, un arte tradicional estático de barrera parecido a una almadraba de pequeño tamaño.

El pez de limón es una especie trofeo para los pescadores deportivos que la capturan al curricán, al curricán de fondo o mediante la práctica del jigging. También es una captura muy estimada por los pescadores submarinos, que la capturan a la espera.

Comercialización

El pez de limón es bastante apreciado gastronómicamente, si bien su aceptación es desigual a lo largo de la geografía española.

Se desembarca fresco y entero.

