



RONCADOR

BGR

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)



Nombres **FAO**: **es** ronco mestizo
fr grondeur métis
en bastard grunt



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 50 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, alto y ligeramente comprimido, de cabeza puntiaguda. La talla más común son 25 cm.

Ojos muy grandes. Boca pequeña y ligeramente oblicua. Presencia de poros submandibulares.

Muestra una mancha negra en el opérculo. Borde del preopérculo aserrado y ángulo preopercular liso.

Aleta dorsal larga y muy escotada entre la zona de radios duros y radios blandos.

Posee 12 espinas en la parte delantera, las tres primeras más cortas que los 8 siguientes. Aleta pectoral larga y puntiaguda. Aletas pélvicas algo más pequeñas que las pectorales; con un radio duro y 5 blandos. Aleta anal de base corta y con 3 radios duros; el primero mucho más corto que los otros dos, y el resto blandos. La aleta caudal ancha y ahorquillada.

Especies con caracteres semejantes
Pomadasys stridens (ronco de tres bandas)

Nombres Comerciales y Locales


Andalucía	roncaor, roncaores, ronco mestizo
Canarias	roncón, roncador, tronelero
Cataluña	xerla roncadora
Galicia	roncador bastardo

Descripción General

Color marrón claro uniforme a lo largo de todo el cuerpo. Aletas dorsal, anal y caudal de color marrón oscuro.

Posee una escama especial en la axila de las aletas pélvicas. Línea lateral muy marcada y paralela al perfil dorsal.

Mandíbula inferior igual o más corta que la superior. Presenta varias filas de pequeños dientes cónicos en ambas mandíbulas, el vómer y los palatinos.



Hábitat y comportamiento



Especie demersal que vive a una profundidad comprendida entre 10 y 60 m sobre fondos de roca y de arena.

Sus hábitos son gregarios y forma cardúmenes que pueden llegar a estar constituidos por cientos de individuos, los cuales suelen permanecer siempre en los mismos lugares. Estas agrupaciones pueden cubrir grandes zonas del fondo, formando auténticas murallas o nubes de peces. Carácter inquieto y esquivo. Se caracterizan por emitir ronquidos o gruñidos sordos que producen al frotar los dientes faríngeos, a la vez que utilizan la vejiga natatoria a modo de amplificador.

Alimentación carnívora, compuesta principalmente de invertebrados bentónicos.

Distribución




Se encuentra distribuido en el Atlántico este, desde el Estrecho de Gibraltar hasta las costas de Angola y en la mayor parte del Mar Mediterráneo a excepción del mar Negro.

Reproducción

La reproducción tiene lugar durante el verano.

El crecimiento es muy rápido y su esperanza de vida es de 7 años.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Escaso interés pesquero. Se captura como especie accesoria en la pesca de arrastre y de redes de enmalle (trasmallo). También se pesca con cordel y nasa.

Comercialización

Escaso valor comercial. Se desembarca fresco y entero.

