


CORVINA

MGR

Argyrosomus regius (Asso, 1801)



Nombres **FAO**: es corvina
fr maigre commun
en meagre



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	80	
comercial	-	-	-		

LONGITUD MÁXIMA: 230 cm

Caracteres más significativos

Especie de gran tamaño. Su tamaño normal se encuentra entre 50 y 100 cm de longitud. Presenta un cuerpo alargado, poco comprimido y más bien fusiforme que contrasta con los cuerpos comprimidos y altos de la mayoría de especies de la familia.

El hocico es redondeado y presenta una boca oblicua, grande y ancha, en posición inferior. El maxilar se extiende hasta la mitad posterior del ojo y la mandíbula inferior es ligeramente prominente. El mentón no presenta barbillón pero hacia la punta del hocico se pueden observar de 3 a 5 poros. La línea lateral es perfectamente visible y sigue la línea dorsal del cuerpo hasta el final de la cola.

La aleta dorsal es larga y continua pero presenta una escotadura muy pronunciada: la parte anterior está formada 9-10 radios duros espinosos (el primero muy corto) y la parte posterior por una sola espina y 26-29 radios blandos. La aleta anal tiene 2 radios espinosos y 7-8 radios blandos. Las aletas pectorales son cortas y sólo presentan radios blandos. Las ventrales tienen un radio espinoso y el resto, blandos. Aleta caudal ancha, truncada o en forma de una S poco acusada.

Especies con caracteres semejantes

Umbrina cirrosa (verrugato)

Sciaena umbra (corvallo)


Pseudotolithus typus (corvina bosoro)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	corbina, corva, corvinata, corvinato, pardilleja
Asturias	berrugate, berrugueta, corballo, curvina
Canarias	corvinato
Cantabria	berrugate, berrugueta, berruguete, corbina, curvina
Cataluña	corb reig, corba, corball, corball blanc, corball reig, corballina, rech, reig, reix, retx
Com. Valenciana	corb, corb reig, corba, reig, reiger
Galicia	berrugate, corbina, corvina real, curbina, curvina
País Vasco	andeja, anteja, antesa, burbina, merua

Descripción General

El color del cuerpo es gris plateado, más oscuro en el dorso. En los flancos se aprecian reflejos bronceos y en las aletas pardo rojizos. En los individuos recién pescados se puede observar el interior de la boca de color anaranjado.



Escamas grandes y ctenoideas en todo el cuerpo, excepto en determinadas zonas de la cabeza, donde son pequeñas y cicloideas.

Posee pequeños dientes dispuestos en varias bandas estrechas: en la mandíbula superior destacan los de la zona anterior por ser los mayores, mientras que en la inferior se disponen en 2 o 3 bandas irregulares.

Los otolitos son excepcionalmente grandes. La vejiga natatoria está muy desarrollada y posee gran número de divertículos arborescentes y ocupa una buena parte del abdomen.

Se trata del mayor esciéndido de nuestras aguas. Puede llegar a pesar 103 kg.

Hábitat y comportamiento



Especie demersal de carácter litoral. Habita formando bancos en aguas someras de la plataforma continental sobre fondos predominantemente arenosos, aunque se puede encontrar a relativa

profundidad (200 m).

Carácter eurihalino; puede penetrar en los estuarios y lagunas costeras.

Pez voraz que se alimenta principalmente de peces gregarios (clupeidos, mugilidos, y aterínidos entre otros) a los que persigue. También puede alimentarse de crustáceos.

Los machos (quizá también por las hembras, aunque en menor grado) pueden emitir unos fuertes sonidos, gracias a la vejiga natatoria, que es utilizada para amplificar los sonidos que genera mediante la musculatura sónica.

Distribución




Se encuentra en el Atlántico oriental, desde Noruega al Congo y en todo el Mediterráneo. También ha penetrado en el mar Rojo a través del canal de Suez.

Reproducción

La corvina madura a una edad relativamente avanzada, estimada en unos 6 años. Se reproduce de mayo a julio en el golfo de Vizcaya y de abril a julio en el Mediterráneo. Adquiere un comportamiento gregario y se reúne en bancos cerca del litoral para la freza. Es durante esta época cuando la corvina emite unos gruñidos, que aunque no se tiene certeza de su significado, son de dos clases: los largos, regulares y que sirven como llamada para establecer la agregación reproductiva, y los cortos, señal del inicio de la freza.

Los alevines suelen ocupar aguas más superficiales cercanas a los estuarios.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Especie muy apreciada tanto por pecadores profesionales como por los deportivos debido a su gran tamaño. Se captura con artes de enmalle, arrastre, palangre y curricán. Los sonidos que emite la corvina en época de reproducción son tan sonoros que en ciertas zonas han sido incluso utilizados desde antiguo por los pescadores como guía para localizar los peces.

Comercialización

Su carne es de excelente calidad y bastante apreciada. De notable importancia económica, sobretodo en mercados locales costeros. Se comercializa fresco y congelado, bien entero o eviscerado, y en conserva.

Actualmente se está experimentando la posibilidad de cultivar esta especie.

