



ALIGOTE

SBA

Pagellus acarne (Risso, 1826)



Nombres **FAO**: **es** aligote
fr pageot acarné
en axillary seabream



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M→	H
mínima	-	12 (7)	-		
comercial	-	-	-	13-18	17-29

LONGITUD MÁXIMA: 35 cm

Caracteres más significativos

Posee el cuerpo fusiforme, alargado y moderadamente comprimido. Espárido de pequeño tamaño que comúnmente alcanza una longitud de 20-25 cm.

El perfil de la cabeza está deprimido por encima de los ojos y el espacio interorbital es plano. El hocico es chato. Los ojos son grandes, con un diámetro menor o igual que la longitud de la boca. La boca es relativamente pequeña y la comisura llega a la altura del margen anterior del ojo. Tiene dientes en ambas mandíbulas, afilados y puntiagudos en la parte anterior y molariformes en la zona posterior. El interior de la boca es rojo anaranjado. Presenta una característica mancha oscura en el punto de inserción de las aletas pectorales. Posee una sola aleta dorsal con radios duros seguidos de radios blandos, que comienza a la altura de la aleta pectoral y finaliza antes del pedúnculo caudal. La pectoral no tiene radios duros, es muy larga y acaba en punta. La aleta anal dispone de 3 radios duros y el resto son blandos; su longitud es bastante menor que la dorsal. El último radio de la anal y de la dorsal es claramente más fuerte que los precedentes. Aletas pélvicas con un radio duro y el resto blandos. Aleta caudal bastante bifurcada.

Especies con caracteres semejantes


Pagellus bogaraveo (besugo)
Pagellus bellottii (breca chata)
Pagellus erythrinus (breca)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	besugo, besugo blanco, besuguito
Asturias	machote, pancho pedrés
Baleares	besuch, besug
Canarias	besugo, besuguito
Cantabria	aguilote, galigote, pancho (juveniles)
Cataluña	besuc, besuc blanc, besuch, besugo, besugu, besuguet, boga, boga ravella, boga-ravell, calet, patxano, paxano, quelet, ravella
Com. Valenciana	besuc blanc, besugo, besugu, boca-ravell, pagel
Galicia	alimol, besugo, besugo chato, bica, bicuda, buraz, chato, ollomol, panchito, pancho, pancho bicudo, pancho picudo, vica
Murcia	besug
País Vasco	ailueta, allueta, aliota, aliyota, aliyotá, lentoe, lentoea, lentol, neskazahar


Descripción General

La coloración del cuerpo es rosada, más oscura sobre el dorso y más clara y con reflejos plateados en el vientre. Cabeza más oscura, particularmente entre los ojos. Presenta una característica mancha oscura en el punto de inserción de las aletas pectorales, en el área superior. Las aletas son rosadas, con el borde distal más oscuro, especialmente la caudal.



Línea lateral nítida, que se extiende hasta el pedúnculo caudal. Presenta una franja de dientes cónicos y pequeños, seguidos por 2 hileras de molares en cada mandíbula.

Hábitat y comportamiento



Especie demersal que vive en fondos blandos, arenosos o fangosos. Vive cerca de la costa, entre 40 y 100 m, si bien alcanza hasta unos 200 m de profundidad en la plataforma continental me-

diterránea o hasta 500 m en la atlántica.

Los mayores ejemplares se hallan a más profundidad. Los juveniles habitan aguas más superficiales que los adultos y se suelen observar en praderas de *Posidonia oceanica* en el Mediterráneo o en lugares abrigados, sobre fondos arenosos próximos a zonas rocosas, a menos de 10 m de profundidad.

En el Mediterráneo las tres especies de *Pagellus* (*P. acarne*, *P. bogaraveo* y *P. erythrinus*) se reparten el espacio en el marco de la plataforma y el talud continental: el aligote (*P. acarne*) muestra una distribución algo más profunda que la breca (*P. erythrinus*) y menos profunda que el besugo (*P. bogaraveo*).

Carnívoro que excava en los fondos para alimentarse de una variada gama de invertebrados bentónicos, como gusanos, moluscos y crustáceos, larvas de peces y pequeños peces.

Distribución




Se encuentra en el Atlántico oriental, desde el golfo de Vizcaya (raro más al norte) hasta las costas de Senegal, incluidas las de las islas de Madeira, Cabo Verde y Canarias. También se encuentra en todo el Mediterráneo, donde es más abundante en la cuenca oriental.

Reproducción

Hermafrodita proterándrico. Se comporta primero como macho entre el primer y el segundo año de vida y la inversión sexual se produce entre los 2 y 7 años, en función de la temperatura del agua.

La freza se produce entre aguas y la reproducción ocurre de junio a septiembre, en el Mediterráneo, y de marzo a noviembre en el Atlántico. En las aguas más cálidas de las Canarias, los aligotes se reproducen de octubre a marzo, con un pico de actividad muy marcado entre diciembre y enero, y en el mar de Alborán la reproducción se produce de primavera (mayo) a otoño (octubre).

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

El aligote soporta una notable explotación por parte de los pescadores profesionales, que lo capturan tanto al arrastre como mediante artes de enmalle o al cerco. Las mayores capturas se realizan al arrastre.

Los pescadores deportivos lo capturan mediante volantín, desde embarcación, sobre fondos arenosos o fangosos.

Comercialización

A pesar de su escaso tamaño, el aligote es una especie apreciada. Está regularmente presente en los mercados del interior. Se desembarca y comercializa fresco, en piezas enteras.

