



# OBLADA

## SBS

*Oblada melanura* (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** oblada  
**fr** oblade  
**en** saddled seabream



| Talla (cm) | Caladeros |     |     | Edad de Maduración Sexual (años) |
|------------|-----------|-----|-----|----------------------------------|
|            | CANT Y W  | MED | CAN |                                  |
| mínima     | -         | -   | -   | 2                                |
| comercial  | -         | -   | -   |                                  |

**LONGITUD MÁXIMA: >30 cm**

### Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, alargado, poco comprimido y de perfil convexo. Son habituales los ejemplares de entre 15 y 25 cm.

La característica más inconfundible de la oblada es la conspicua mancha negra orlada de blanco que posee en el pedúnculo caudal.

Ojos grandes y redondos. Boca pequeña y oblicua algo protráctil, y con la mandíbula inferior ligeramente prominente. Cada mandíbula tiene una fila externa de 8-10 dientes incisivos, detrás los cuales hay multitud de pequeños dientes cóni-

cos poco desarrollados y ralos.

Aleta dorsal con 11 espinas y 13-14 radios blandos. Aleta anal con 3 radios duros y 13-14 blandos. Aletas pectorales grandes, y las ventrales con una espina y 5 radios blandos. Aleta caudal ahorquillada.

#### Especies con caracteres semejantes

*Sarpa salpa* (salema)

*Spondyliosoma cantharus* (chopa)


*Sparus aurata* (dorada)

### Nombres Comerciales y Locales

|                 |  |
|-----------------|--|
| Andalucía       | chopa, doblá, dobladeta, doblaeta, oblata  |
| Asturias        | chepa, chopera, chopeta, negrita, zapatero   |
| Baleares        | oblade, orada, ublada, ublade, urada   |
| Canarias        | galán, galana  |
| Cantabria       | ahujada, chepa, ojada, perpelute, pintacola, pintalacola, zapatero                 |
| Cataluña        | aurada, aurada plat, aurada platejada, beata, dobladeta, orada, platejada, virador |
| Com. Valenciana | aurada plat, beata, oblaes, virador  |
| Galicia         | chepa, zapatero  |
| Murcia          | dobla, doblá   |
| País Vasco      | bustambeltza, bustambeltz, buzten baltza, collaka, perpelute, virador, zapatero    |

## Descripción General

Color gris azulado o verdoso en el dorso y plateado en los flancos y el vientre, con líneas longitudinales oscuras a lo largo de las hileras de escamas más o menos difuminadas. La característica mancha negra orlada de blanco que



posee en el pedúnculo caudal no se cierra por abajo, por lo que parece una silla de montar (de ahí su nombre en inglés, *saddled seabream*). Todas las aletas tienen colores claros. El cuerpo de los juveniles recién asentados es pardo uniforme pero ya presenta la mancha característica en el pedúnculo caudal. Rostro corto con escamas cicloideas sobre las mejillas y la parte anterior del preopérculo (la posterior está desnuda). Línea lateral cubierta de 64-67 escamas.

## Hábitat y comportamiento



Se trata de un buen nadador, neotónico costero y gregario, que rara vez se aventura más allá de los 30 m de profundidad. Normalmente se encuentra asociado a fondos rocosos o praderas de fanerógamas (*Posidonia oceanica* en el Mediterráneo). Se alimenta de zooplancton (principalmente copépodos) y pequeños peces, a los que ataca con notable voracidad; también come invertebrados bentónicos (crustáceos sobre todo). Se trata de un predador oportunista que no duda en atacar las puestas de otros. Captura incluso insectos caídos al mar.

## Distribución



La oblada presenta una distribución relativamente amplia en el Atlántico oriental, desde el golfo de Vizcaya hasta Angola, incluidas las islas de Madeira, Cabo Verde y Canarias. Debido al progresivo calentamiento de los mares, la oblada ha llegado a aparecer en las costas inglesas.


## Reproducción

La oblada presenta los sexos separados. La primera madurez sexual se produce en el segundo año de vida. A partir de este momento las hembras crecen más rápido que los machos y también viven más tiempo. La oblada puede llegar a los 11 años de edad.

La reproducción tiene lugar de abril a junio en el Mediterráneo. Los jóvenes aparecen desde finales de abril hasta mayo, en lugares protegidos y siempre asociados a bloques rocosos con una pendiente muy marcada. Cuando pierden la tonalidad par-

da y adquieren la librea plateada, abandonan su refugio y se dirigen hacia aguas libres superficiales. Durante el invierno estos ejemplares se muestran muy poco activos y habitan en zonas abrigadas formadas por grandes rocas. Al calentarse el agua, en primavera, los juveniles de casi un año recuperan la actividad y se desplazan hacia aguas abiertas en donde progresivamente se integran al hábitat de los adultos.

## Evolución Capturas Españolas



## Artes de Pesca

Las grandes pescas se realizaban con el efectivo arte claro, actualmente prohibido en ciertas comunidades autónomas. Rara vez se captura mediante trasmallos.

En pesca deportiva se captura desde la costa, mediante el empleo de caña y flotador de media agua, empleándose como cebos masillas hechas con pan o harinas aromatizadas con sardinas u otros peces, e incluso señuelos que parecen pequeñas angulas.

## Comercialización

En España la oblada no es tan apreciada como en otros países, como por ejemplo Italia, en donde alcanza un cierto precio. Por esta razón, una parte importante de la que se captura en las costas españolas se exporta al extranjero. Se desembarca y comercializa fresco y entero.

