


LIJA ÁSPERA

TRI

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)



Nombres **FAO**: es lija áspera
fr baliste
en planedhead filefish



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)		
	CANT	Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	13,9	14,9
comercial	-	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 27,5 cm

Caracteres más significativos:

Cuerpo alto y comprimido, de aspecto ovalado. La primera aleta dorsal se reduce a una fuerte espina. La altura máxima del cuerpo se encuentra al principio de la segunda aleta dorsal. El tamaño habitual es de 15-20 cm.

Los ojos se sitúan muy cerca del perfil dorsal de la cabeza. Boca pequeña con labios carnosos, situada en posición terminal. Encima de las aletas pectorales se encuentran las hendiduras branquiales, que son pequeñas y oblicuas.


Presenta dos aletas dorsales; la primera está reducida a un radio prominente y fuerte a modo de espina que tiene el borde posterior aserrado. La segunda aleta dorsal está formada por 29-35 radios blandos, y se sitúa en posición opuesta a la aleta anal, que tiene forma y longitud similar con 30-35 radios blandos. Las aletas pectorales son cortas y redondeadas. La aleta caudal es redondeada.

Nombres Comerciales y Locales

Canarias	gallito
----------	---------

Descripción General

Color marrón grisáceo, verdoso, amarillento o azulado. Las aletas tienen colores blanquecinos o amarillentos. La piel es rugosa y gruesa, y presenta escamas grandes y gruesas. La línea lateral es poco visible.



Hábitat y comportamiento



Se encuentra en todo tipo de fondos, siendo especialmente abundante sobre sustratos rocosos.


Puede encontrarse en solitario o formando grupos de 4 o 5 individuos.

Nada siempre en las proximidades del fondo; lo hace de forma pausada, utilizando las aletas dorsales y anal, pero cuando se siente acosado nada rápidamente ayudándose de su aleta caudal, que tiene forma de abanico. El pez eriza y repliega su espina dorsal a voluntad, normalmente cuando se siente amenazado.

Tiene la capacidad de adoptar diferentes coloraciones en función del fondo en el que se encuentre, con el fin de conseguir confundirse con este.

Especie omnívora que se alimenta de erizos de mar, anfípodos, hidrozoos, moluscos y materia vegetal.

Distribución



Se encuentra en el Atlántico oeste, desde Canadá, las islas Bermudas y el golfo de Méjico hasta Uruguay, y en el Atlántico este, desde las islas Canarias hasta Angola.

Reproducción

El periodo reproductor se extiende desde mayo hasta noviembre.

Cada hembra pone entre 1.400 y 91.000 huevos.

Artes de Pesca

Aunque es una especie comestible, no es objeto de ninguna pesquería. Se captura con anzuelo y redes de enmalle.

Comercialización

Especie no comercial de escaso valor económico. Se desembarca fresco y entero.

