



# TAMBORIL

## PUA

*Sphoeroides marmoratus* (Lowe, 1838)



Nombres **FAO**: es tamboril  
fr -  
en bandtail puffer



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT	Y W	MED	CAN	
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

UICN: NT

LONGITUD MÁXIMA: 20 cm

### Caracteres más significativos:



Cuerpo de color marrón salpicado de manchas oscuras. Presenta entre 11 y 14 manchas redondeadas de color negro en la cabeza y en la parte inferior de los laterales del cuerpo. El tamaño más común del tamboril oscila entre 10 y 20 cm.

El cuerpo carece de escamas, pero está recubierto de pequeñas espinas, lo que le confiere un aspecto rugoso.

La aleta dorsal está constituida por 9 radios blandos. Carece de aletas pélvicas.

### Especies con caracteres semejantes:

*Canthigaster rostrata* (gallinita)



## Hábitat y comportamiento



Habita en fondos rocosos, rocoso-arenosos y en praderas de fanerógamas, a una profundidad comprendida entre 2 y 60 m de profundidad.

Por lo general, se desplaza de manera solitaria. Como mecanismo de defensa, al igual que el resto de tetraodóntidos, infla su vientre de manera muy apreciable tragando agua o aire, incrementando así notablemente su volumen.

Especie muy voraz que posee una alimentación muy variada, compuesta principalmente por crustáceos, moluscos, poliquetos y algas.

## Distribución



Se encuentra en el Atlántico oriental, desde Portugal a Angola.

## Artes de Pesca

No existe una pesca dirigida.

## Comercialización

Se trata de una especie sin interés comercial. Se desembarca entero y fresco.

