



BOCA DE ORO GRA

Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833)



Nombres **FAO**: **es** burro listado
fr grondeur rayé
en african striped grunt



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 50 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y algo comprimido. El tamaño más común oscila entre los 15 y los 25 cm.

Ojos muy grandes con respecto al cuerpo. Boca grande y oblicua. Mandíbula inferior ligeramente prominente. Presencia de poros submandibulares. Preopérculo aserrado en toda su longitud.

Aleta dorsal larga y no escotada, con los 13 primeros radios espinosos seguidos de 13-14 radios blandos. Las tres primeras espinas

son mucho más cortas que las que le siguen. Aletas pélvicas de mayor tamaño que las aletas pectorales; con un radio duro y 5 blandos. Base de la aleta anal corta, formada por 3 radios duros y el resto blandos. La primera espina es mucho más corta que las otras. Aleta caudal ancha y escotada.

Especies con caracteres semejantes


Plectorhinchus mediterraneus
(burro chiclero)

Nombres Comerciales y Locales

Canarias	boca de oro, burrito, burrito canario, burrito listado
Cataluña	xerla ratllada
Galicia	roncador riscado

Descripción General

Cuerpo de color marrón, más oscuro en el dorso y más claro y con matices dorados en el vientre. Cada superficie lateral está atravesada en la parte superior por cuatro líneas longitudinales de color blanquecino.



Posee una escama especial en la axila de las pélvicas. Línea lateral bien visible y paralela al perfil dorsal.

Presenta varias filas de pequeños dientes cónicos en las mandíbulas, el vómer y los palatinos.

Hábitat y comportamiento



Especie nectobentónica que vive en zonas costeras a una profundidad máxima de 60 m, sobre fondos rocosos, arenosos, cascajo, corales y detritus.

Hábitos gregarios; se encuentra formando grupos que pueden llegar a estar constituidos por cientos de individuos. Son peces muy inquietos que nadan continuamente, siempre muy próximos al fondo. Cuando se sienten amenazados buscan refugio en cuevas, aberturas, paredes verticales, bloques de rocas e interior de esponjas.

Alimentación carnívora, compuesta por crustáceos y moluscos bentónicos.

Distribución




Se encuentra en el Atlántico este, desde las costas de España hasta las de Angola y en el Mediterráneo occidental (mar de Alborán e islas Baleares).

Reproducción

No hay datos sobre la reproducción de esta especie.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Escaso interés pesquero. Se captura con cordel, nasa o trasmallo.

Comercialización

Escaso valor comercial. Se desembarca fresco y entero.

