


ESCORPIÓN

WEG

Trachinus draco (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** escorpión
fr grande vive
en greater weever



Talla (cm)	Caladeros			Edad de Maduración Sexual (años)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-		
comercial	-	-	-	3	

LONGITUD MÁXIMA: 53 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, estrecho y comprimido lateralmente. El tamaño común oscila entre los 30 y 35 cm. Cabeza pequeña, compacta y con el hocico corto.

La cabeza es corta. Los ojos son relativamente grandes, se encuentran en posición alta y están muy próximos entre sí; además presentan 2 o 3 pequeñas espinas delante de cada uno de ellos. Espacio interorbital ligeramente cóncavo. Boca ancha y oblicua, y está dotada de dientes viliformes abatibles.

En cada opérculo presenta una fuerte y larga espina venenosa. También presenta glándulas de veneno en las espinas de la primera dorsal.

Posee dos aletas dorsales. La primera es corta y compuesta por entre 5 y 7 espinas. La segunda, de larga longitud y situada de forma opuesta a la aleta anal, está constituida sólo por radios blandos (de 29 a 32). La aleta anal también es muy larga y está compuesta por 2 espinas y 28-34 radios blandos. Las aletas pectorales presentan una forma trapezoidal característica de la familia; las aletas ventrales están en posición yugular. Pedúnculo caudal corto y aleta caudal ligeramente cóncava.

Especies con caracteres semejantes:


Trachinus araneus (araña)
Trachinus radiatus (vibora)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	araña
Asturias	araño, escarapocho, escorpión de arena, esquirpión, pexegafu, raña, salvareo
Baleares	araniol, aranya blanca, aranya monja, aranyol, araña blanca, araña monja, dragó, monja
Canarias	araña, araña de poco agua
Cantabria	araña, araño, escorpión de arena, escurpión, mordeguera, salvareo, salvariego
Cataluña	aranya, aranya blanca, aranya esparenca, aranya monja, aranya vera, dragó
Com. Valenciana	aranya, aranya nera, aranya vera, araña
Galicia	araño, chaquedit, peixe araña, peixe araña, peixe araña, salvareo
País Vasco	armiari marrai, dragón-quiqui, lapavicha, rabiroi, sabirón, saburdín, salbeo, salbera, salvario, salvirón, schabiroya, shabraya, xabiroi, xabiroyuri, xabirón, xabiroyá, zakalchuria

Descripción General

Dorso de color gris verdoso con manchas oscuras sobre la cabeza. Región ventral blanca y los flancos de color blanco amarillento. El cuerpo se encuentra cubierto de escamas cicloideas cuya disposición en líneas oblicuas y su coloración, da lugar a finas estrías oblicuas y alternas de color marrón, azul claro y amarillo. Sobre la primera aleta dorsal destaca una mancha negra, en la segunda dorsal una amarilla y en la anal una malva. La segunda aleta dorsal y la aleta anal están ribeteadas de un azul claro.



Línea lateral rectilínea, cubierta por 80-83 escamas. Las mejillas, parte del preopérculo y casi todo el opérculo están cubiertos de escamas cicloideas dispuestas en líneas oblicuas.

El veneno que poseen le sirve como protección contra sus depredadores, es de color azulado y contiene neurotoxinas. Su presencia en las playas supone un peligro para los bañistas, que pueden pisarlo. Su picadura causa un fuerte dolor, y puede provocar vómitos, fiebre y dificultad respiratoria; si bien estos síntomas dependerán tanto de la cantidad de veneno inoculado como del estado fisiológico del individuo afectado.

Hábitat y comportamiento



Especie estrictamente bentónica y litoral, aunque puede llegar a encontrarse a 300 m de profundidad.

El escorpión es un pez solitario que normalmente se halla enterrado en la arena, donde permanece inmóvil, dejando asomar únicamente los ojos y el extremo de la aleta dorsal. De esta manera pasa desapercibido para sus presas, básicamente peces y, en menor medida, crustáceos, sobre las que salta súbitamente con la boca abierta cuando se acercan a él.

Presenta hábitos nocturnos: durante la noche sale de su escondite y nada libremente entre aguas.

Puede ser agresivo y atacar al observador si se considera molestado.

Puede ser agresivo y atacar al observador si se considera molestado.

Distribución




Se distribuye desde Noruega a Mauritania, incluidas las islas de Madeira y Canarias. También está presente en todo el Mediterráneo y el mar Negro.

Reproducción

La madurez sexual se alcanza a los 3 años de edad. La puesta tiene lugar durante los meses de verano hasta principios de otoño. Los huevos son esféricos (1 mm de diámetro) y lisos; éstos eclosionan 4 o 5 días después de haber sido depositados por la hembra en el sustrato. Los huevos y las larvas son superficiales y las postlarvas se encuentran a muy poca profundidad y se caracterizan por tener varios melanóforos (célula que contiene melanina) en el cuerpo.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura frecuentemente al arrastre junto con otras muchas especies; con otros artes su pesca es más bien ocasional.

Los pescadores deportivos los capturan al volantín o incluso practicando el *jigging* con señuelos artificiales, siempre sobre fondos arenosos. También se producen capturas pescando a fondo desde la playa, especialmente durante las horas crepusculares.

Comercialización

Especie comercial de carne relativamente apreciada gracias a su color blanco, su consistencia y su sabor a marisco. Suele venderse como parte de la morralla. Se vende fresco y congelado. Los ejemplares de esta especie deben manipularse con gran cuidado debido al veneno que poseen. Se desembarca fresco principalmente entero; también eviscerado.

