



# VÍBORA

## WEX

*Trachinus radiatus* (Cuvier, 1829)



Nombres **FAO**: **es** araña  
**fr** grande vive  
**en** greater weever



Talla	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (años)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima (cm)	-	-	-	M	H
comercial (cm)	-	-	-	-	-

**LONGITUD MÁXIMA: 50 cm**

### Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y comprimido lateralmente, más alto que el del escorpión. El tamaño común oscila entre los 25 y 30 cm.

Cabeza pequeña, compacta y con el hocico corto. Los ojos son pequeños, se encuentran en posición alta y están muy próximos entre sí, a una distancia aproximadamente igual a la mitad del diámetro del ojo. Detrás de ellos se pueden observar 5 placas óseas rugosas. Boca ancha y oblicua, con la mandíbula inferior prominente y dirigida hacia arriba y está dotada de dientes viliformes abatibles.

En cada opérculo presenta una fuerte y larga espina venenosa. También presenta glándulas de veneno en las espinas de la

primera dorsal.

Posee dos aletas dorsales. La primera está compuesta por 7 espinas. La segunda, situada de forma opuesta a la aleta anal, está constituida sólo por radios blandos (de 24 a 27). La aleta anal es muy larga y está compuesta por 2 espinas y 26-29 radios blandos. Las aletas pectorales presentan una forma trapezoidal característica de la familia; las aletas ventrales están en posición yugular. Pedúnculo caudal corto y aleta caudal ligeramente cóncava.

#### Especies con caracteres semejantes:


*Trachinus araneus* (araña)  
*Trachinus radiatus* (víbora)

### Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	araña
Baleares	aranya, aranya fragata, araña, araña fragata, fragata
Cataluña	aranya, aranya de roca, aranya espasenca, aranya fragata, araña
Com. Valenciana	aranya, aranya fragata, araña, araña de roca
Galicia	faneca brava

## Descripción General

Dorso de color pardo amarillento o marrón claro con manchas anulares oscuras y diversas vermiculaciones dispuestas en series longitudinales en los flancos, dorso y cabeza. Esta última puede presentar los opérculos más oscuros. La aleta dorsal delantera es negra, y la segunda dorsal y la anal son azuladas y moteadas de marrón.



El cuerpo se encuentra cubierto de escamas cicloideas cuya disposición en líneas oblicuas y su coloración, da lugar a finas estrías oblicuas y alternas de color marrón, azul claro y amarillo.


Línea lateral rectilínea. Las mejillas, parte del preopérculo y casi todo el opérculo están cubiertos de escamas cicloideas dispuestas en líneas oblicuas.

El veneno que poseen le sirve como protección contra sus depredadores, es de color azulado y contiene neurotoxinas. Su presencia en las playas supone un peligro para los bañistas, que pueden pisarlo. Su picadura causa un fuerte dolor, y puede provocar vómitos, fiebre y dificultad respiratoria; si bien estos síntomas dependerán tanto de la cantidad de veneno inoculado como del estado fisiológico del individuo afectado.

## Hábitat y comportamiento



Especie típica de fondos blandos, arenosos, fangosos o detríticos, con frecuencia cercanos a fondos duros. Puede vivir hasta a 150 m de profundidad, pero normalmente lo hace entre los 20 y los 60 m.



Vive normalmente enterrada y probablemente es más activa de noche.

Se alimenta básicamente de peces y crustáceos y se reproduce en la

primavera y el verano.

Durante la época de reproducción se vuelve especialmente agresiva y puede atacar a los buceadores que se le acercan. El ataque es muy violento y rápido: el pez se abalanza a toda velocidad sobre su víctima y le asesta varios golpes, bastante fuertes, con el opérculo y con su aleta dorsal. Justo antes del ataque, el pez amenaza arqueando exageradamente el cuerpo.

## Distribución



La víbora está presente en el Atlántico oriental desde Gibraltar al golfo de Guinea, incluyendo las islas de Madeira y Canarias.

## Reproducción

La reproducción es probablemente parecida a la de *Trachinus draco*.

## Artes de Pesca

Se captura frecuentemente al arrastre y, más ocasionalmente, con trasmallos. Los pescadores deportivos la capturan al volantín de fondo.

## Comercialización

Especie comercial de carne relativamente apreciada gracias a su color blanco, su consistencia y su sabor a marisco. Suele venderse como parte de la morralla. Se vende fresco y congelado. A pesar de su aspecto amenazador y de su carácter venenoso, esta especie es bastante apreciada. Debe manipularse con gran cuidado debido al veneno que posee. Se desembarca fresco principalmente entero; también eviscerado.

