



PESTE DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES

19.06.2026



ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD	3
3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSA Y LA FAO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PPR	5
4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EUROPA	7
4.1. BULGARIA	7
4.2. GRECIA.....	9
4.3. HUNGRÍA.....	10
4.4. RUMANÍA.....	11
4.5. ALBANIA	12
4.6. KÓSOVO.....	13
4.7. CROACIA	13
5. ACTUACIONES EN LA UE	14
6. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN OTROS PAÍSES AFECTADOS	16
6.1. ARGELIA.....	16
6.2. ISRAEL.....	16
6.3. LIBIA.....	18
6.4. MARRUECOS.....	19
6.5. TÚNEZ	20
6.6. TURQUÍA.....	21
7. DETECCIÓN DE PPR EN CAMELLOS	22



1. INTRODUCCIÓN

La Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR), también conocida como peste ovina y peste caprina, es una enfermedad vírica de los caprinos y ovinos caracterizada por fiebre, llagas en la boca, diarrea, neumonía y a veces la muerte. Está causada por un Morbilivirus de la familia Paramyxoviridae que está relacionado con la peste bovina, el sarampión y el moquillo canino.

Los hospedadores naturales son las ovejas y las cabras, aunque también se ha descrito la enfermedad en otras especies de ungulados salvajes, como gacelas y órices. Además, puede infectar también a ganado bovino, búfalos, camellos y cerdos, en los que no se desarrollan signos clínicos y no pueden transmitir la enfermedad a otros animales.

Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y en la Lista A de enfermedades de notificación obligatoria de la Unión Europea.

Para más información sobre la enfermedad se puede consultar el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/peste-pequenos-rumiantes/peste_peq_rumiantes.aspx

2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD

Desde su identificación inicial en Côte d'Ivoire en 1942, la PPR se ha descrito de forma endémica en Oriente Medio (Península Arábiga, Turquía, Irán e Irak), sur de Asia (India, Nepal y Bangladesh) y África, continente en el que a excepción de Egipto, la enfermedad se encontraba acantonada en los países al sur del Sáhara, hasta que en julio de 2008 Marruecos notificó oficialmente a la OMSA la aparición de la enfermedad en su territorio, donde la enfermedad se dispersó rápidamente por todo el país. La PPR se ha expandido rápidamente en los últimos 15 años y está presente en alrededor de 70 países en el sur y el este de Asia, África y Medio Oriente. En junio de 2018 la enfermedad llegó a la Unión Europea, con un primer caso detectado en Bulgaria y desde entonces ha sido confirmada también en Grecia, Rumanía, Hungría, Albania y Croacia.

Según la información publicada por la OMSA, desde comienzos de 2026 la enfermedad ha estado presente en Burkina Faso, Comoras, Israel, Nepal, Albania, Bulgaria y Croacia.

A continuación, se muestra la ubicación de los focos notificados a la OMSA por los países miembros.



Mapa OMSA localización focos PPR 2025 y 2026

En la siguiente tabla se recoge la información publicada por la OMSA correspondiente a los focos notificados por cada país desde el año 2022 hasta la actualidad.

País	2022	2023	2024	2025	2026
Albania	-	-	-	13	3
Arabia Saudí	270	316	406	294	-
Argelia	18	-	-	-	-
Benin	0	0	209	95	-
Bulgaria	-	-	1	-	-
Burkina Faso	-	-	-	1	-
Camerún	27	89	-	-	-
Chad	3	-	1	2	-
China (Rep. Pop. de)	-	-	2	2	-
Congo (Rep. del)	10	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	2	0	-	1	-
Croacia	-	-	-	5	1
Djibouti	0	0	2	2	-
Egipto	2	4	2	-	-
Emiratos Arabes Unidos	10	18	18	14	-
Eritrea	-	0	-	-	-
Etiopía	78	84	111	111	-
Gabón	-	-	1	-	-
Georgia	-	-	1	-	-



Ghana	85	40	109	149	-
Grecia	-	-	86	-	-
Hungría	-	-	-	3	-
India	77	132	108	29	-
Irán	190	-	-	-	-
Iraq	48	30	68	54	-
Israel	2	2	1	4	1
Kenia	15	7	-	21	-
Kuwait	88	76	94	-	-
Malí	1	2	0	-	-
Marruecos	6	-	-	-	-
Mongolia	3	2	1	-	-
Nepal	6	31	21	7	4
Níger	11	-	-	-	-
Nigeria	867	626	476	298	-
Omán	32	46	160	-	-
Pakistán	638	157	94	12	-
Palestina	18	22	2	-	-
Ruanda	-	1	-	-	-
Rumania	-	-	67	1	1
Senegal	-	37	20	12	-
Somalia	23	30	38	32	-
Sudán	18	22	9	18	-
Togo	120	67	113	41	-
Túnez	10	8	-	-	-
Türkiye (Rep. de)	-	6	38	4	-
Uganda	0	0	2	11	-
Vietnam	-	-	-	2	-
Total general	2.678	1.855	2.261	1.238	10

Focos PPR comunicados a la OMSA años 2022-2026

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSA Y LA FAO PARA EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PPR

En la conferencia internacional celebrada del 31 de marzo al 2 de abril de 2015 en Abiyán (Costa de Marfil), organizada conjuntamente por la OMSA y la FAO, se presentó la Estrategia Mundial para el Control y la Erradicación de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR). A partir de la experiencia adquirida en la erradicación de la Rinderpest y de la disponibilidad de herramientas eficaces, como pruebas diagnósticas específicas y vacunas eficaces, se establecieron las actuaciones necesarias para garantizar su



disponibilidad en los distintos países, junto con un marco jurídico adecuado y el compromiso de las partes implicadas, en un plan estructurado en cuatro etapas con un horizonte temporal de 15 años:

- **Etapla 1:** Evaluación de la situación epidemiológica.
- **Etapla 2:** Control, con vacunación como principal sistema de prevención.
- **Etapla 3:** Erradicación.
- **Etapla 4:** Posterradicación hasta alcanzar el reconocimiento del estatus de país libre de la enfermedad.

Desde el lanzamiento de la estrategia PPR GCES en 2015, se han logrado avances significativos. Entre las principales iniciativas destacan la implementación del [Proyecto Regional de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel \(PRAPS\)](#), diversos proyectos financiados por la Unión Europea, actuaciones apoyadas por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos (DTRA) y el lanzamiento del [Programa Panafricano para la Erradicación de la PPR y el Control de Otras Enfermedades Prioritarias de los Pequeños Rumiantes](#).

No obstante, la propagación continua de la PPR hacia nuevas regiones y su persistencia en áreas endémicas, agravadas por el acceso limitado a servicios veterinarios en comunidades marginadas, siguen constituyendo importantes desafíos para su eliminación. Superar estos obstáculos resulta esencial para alcanzar los objetivos de erradicación, proteger los medios de vida y reforzar la seguridad alimentaria de algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. En este contexto, resulta imprescindible mantener un esfuerzo global sostenido y coordinado que garantice el éxito de la estrategia y fortalezca la resiliencia de las comunidades que dependen de los pequeños rumiantes.

Aunque la vacunación constituye una de las principales herramientas de control, su efectividad depende de su integración con sistemas robustos de vigilancia epidemiológica, evaluación postvacunación y capacidad diagnóstica. Asimismo, es necesario establecer mecanismos de distribución que garanticen la eficacia de las campañas de vacunación y el acceso de las comunidades situadas en áreas remotas. La implementación del programa de erradicación también ofrece un punto de partida idóneo para el diálogo con las comunidades de pastores, especialmente en el Sahel, pudiendo favorecer una mayor resiliencia y la prestación de otros servicios que contribuyan a mejorar la gobernabilidad y la estabilidad. También podrían desarrollarse nuevas vacunas, incluidas vacunas combinadas frente a varias enfermedades o vacunas marcadoras tipo DIVA, que permitan diferenciar animales infectados de animales vacunados y que, además, resulten más económicas o más adecuadas para los objetivos del programa.

En octubre de 2021 se publicaron los resultados de una investigación llevada a cabo por el CISA en colaboración con la Universidad de Parma, en la que se desarrolló una nueva vacuna frente al vPPR basada en un vector viral bovino que expresa una proteína del virus. Los estudios mostraron que los animales vacunados desarrollaban una respuesta



inmune potente frente al virus, compatible con una reducción significativa de la transmisión viral. Además, esta vacuna permite diferenciar animales vacunados de aquellos expuestos al virus, facilitando así la vigilancia epidemiológica en zonas de riesgo.

En 2022, la FAO y la OMSA publicaron el documento *PPR Global Eradication Programme (GEP) II & III Blueprint (2022–2030)*, que actualiza el marco estratégico de erradicación mundial de la PPR manteniendo como objetivo la interrupción de la circulación del virus antes de 2030 y la obtención progresiva del reconocimiento oficial de estatus libre. Este nuevo plan incorpora la experiencia adquirida durante la primera fase del programa (2017–2021) y refuerza un enfoque basado en el análisis de riesgo (*episystems approach*), centrado en identificar las poblaciones y sistemas de producción que mantienen la circulación viral, especialmente en contextos transfronterizos y de pastoreo extensivo. Asimismo, el Blueprint refuerza la necesidad de integrar las campañas de vacunación con una vigilancia epidemiológica robusta, el fortalecimiento de los servicios veterinarios, una mejor gestión de los movimientos animales y una coordinación regional efectiva para prevenir la reemergencia de la enfermedad y alcanzar el reconocimiento oficial del estatus libre por parte de la OMSA.

4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EUROPA

La PPR se declaró por primera vez en Europa en el año 2018 en Bulgaria, tras lo cual no volvió a ser detectada hasta el año 2024 en este mismo país. Los países afectados en Europa hasta la fecha son Albania, Croacia, Hungría, Rumania, Grecia, Bulgaria y Kososvo.

4.1. BULGARIA

El 23 de junio de 2018, Bulgaria notificó su primer foco de peste de los pequeños rumiantes (PPR) en la localidad de Voden (municipio de Bolyarovo, región de Yambol), cerca de la frontera con Turquía, donde la enfermedad sigue presente en algunas zonas. Se vieron afectadas tres explotaciones cuyos rebaños pastaban juntos.

Se aplicaron las medidas de control previstas en la normativa comunitaria, incluyendo:

- Sacrificio de los animales infectados y preventivo de todos los pequeños rumiantes del pueblo (667 ovejas y 171 cabras, todas en explotaciones de traspatio).
- Establecimiento de zonas de protección y vigilancia.
- Restricción de movimientos e intensificación de la vigilancia fronteriza.

Posteriormente:

- 28 de junio: Se detectó un nuevo foco en Kosti (región de Burgas) con 151 ovejas y 9 cabras.



- 9 de julio: El laboratorio de referencia de la UE (CIRAD, Francia) confirmó cuatro nuevos focos en explotaciones de la zona de vigilancia alrededor de Voden, aunque sin signos clínicos visibles.
- 18 de julio: Se confirmó otro foco en una explotación con 203 ovejas en la región de Yambol.

En total, entre junio y julio de 2018 se notificaron al menos siete focos de PPR, todos localizados en el sureste de Bulgaria. En el siguiente mapa se indica la ubicación de los focos registrados en el sistema ADIS.



Mapa focos Bulgaria año 2018 (Fuente: ADNS)

Desde agosto de 2018 Bulgaria no había declarado ningún nuevo foco de PPR en su territorio hasta el 25 de noviembre de 2024 con la confirmación de un nuevo foco en una explotación de la región de Pazardzhik, con un censo de 1.769 ovinos, entre los que hubo 25 animales afectados.



Mapa foco Bulgaria año 2024 (Fuente: ADIS)

Desde entonces Bulgaria no ha comunicado a través de ADIS ningún nuevo foco de PPR en su territorio.

4.2. GRECIA

El 11 de julio de 2024 se confirmó la presencia del virus de la PPR por primera vez en Grecia, en una explotación de 264 ovejas y cabras, entre las que hubo 50 afectadas, localizada en el Departamento Municipal de Kalampaka, Municipio de Meteora, Unidad Regional de Trikala, Región de Tesalia. La sospecha inicial surgió debido a los hallazgos clínicos de fiebre, diarrea, dificultad respiratoria, secreción óculo-nasal, estomatitis necrótica y halitosis en 50 animales. El examen post mortem también reveló inflamación en el abomaso. Inicialmente el veterinario de la explotación sospechó de lengua azul, pero tras obtenerse resultados laboratoriales negativos, se tomaron muestras para analizar PPR, fiebre aftosa, viruela ovina y caprina y ectima contagioso, confirmándose como positivas a PPR en el Laboratorio Nacional de Referencia griego mediante PCR en tiempo real. Las autoridades griegas aplicaron de manera inmediata todas las medidas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión y en el Plan Nacional de Contingencia y se inició una investigación epidemiológica.

A lo largo de 2024 fueron comunicados a través de ADIS un total 86 focos afectando a 5.317 ovinos y caprinos con la siguiente distribución geográfica.



Mapa focos Grecia año 2024 (Fuente: ADIS)


En 2025 y hasta junio de 2026, no ha habido nuevas notificaciones por parte de este país.

4.3. HUNGRÍA

El 27 de enero de 2025 Hungría declaró la presencia por primera vez de PPR en su territorio con la confirmación de un foco en una explotación de ovino en el municipio de Szentgyorgyvolgy, en la comarca de Zala, situado en el oeste del país, muy próximo a la frontera con Eslovenia. La explotación afectada, dedicada al cebo de animales con un censo de 1810 ovinos, había recibido el 15 de enero un movimiento de animales procedentes de un centro de concentración de Rumania. El 16 de enero, de acuerdo con el protocolo de movimiento de ovino desde Rumanía, se tomaron muestras de sangre a los animales, que en ese momento no mostraban signos clínicos compatibles con la enfermedad, y se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia de enfermedades víricas para hacer serología y PCR frente a PPR. El 23 de enero, 3 de las muestras resultaron positivas por serología, confirmándose el 24 de enero la presencia del virus de la PPR mediante la técnica PCR en tiempo real. El 23 de enero la autoridad competente de la unidad veterinaria local visitó la explotación y observó que 12 de los animales del rebaño mostraban signos clínicos compatibles con la PPR, procediéndose a la inmediata inmovilización de la explotación y la aplicación de todas las medidas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión y en el Plan Nacional de Contingencia.



El 31 de enero de 2025 se confirmaron otros 2 focos en la misma región, con un total de 404 ovinos afectados.



Mapa focos Hungría año 2025 (fuente: ADIS)

Hasta junio de 2026, no ha habido nuevas notificaciones por parte de este país.

4.4. RUMANÍA

El 19 de julio de 2024 se confirmó la presencia de la enfermedad por primera vez en Rumanía, en un centro de concentración de corderos en la región de Tulcea. Desde la confirmación del primer foco y hasta finales de 2024, se notificaron a través del sistema ADIS un total de 67 focos. La mayoría de ellos se localizaron en la parte oriental del país, principalmente en áreas próximas al Mar Negro, lo que sugiere una intensa circulación regional del virus. No obstante, siete focos fueron detectados en la zona occidental, en áreas próximas a la frontera con Serbia, evidenciando una dispersión a larga distancia dentro del territorio nacional, compatible con movimientos de animales o contactos epidemiológicos indirectos más que con una difusión espacial progresiva.


En 2025 únicamente se notificó un foco a través de ADIS, en el mes de marzo, que afectó a 664 ovinos en la región de Bihor, zona en la que no se había detectado previamente la enfermedad.

Hasta el momento, en 2026 se ha notificado un único foco, en el mes de junio, concretamente en la localidad de Viisoara, en un rebaño de 882 ovinos, de los cuales 98



resultaron afectados. La notable reducción del número de focos respecto a 2024 podría indicar una contención eficaz de la enfermedad; sin embargo, la detección esporádica de nuevos focos demuestra que el riesgo de reemergencia persiste y que resulta necesario mantener una vigilancia epidemiológica reforzada.

En todos los focos se aplicaron las medidas de control establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 para enfermedades de categoría A.



Mapa focos PPR Rumanía 2024, 2025 y 2026 (hasta 18 junio) (fuente: ADIS)


4.5. ALBANIA

El 4 de junio de 2025 se confirmaba un foco de PPR en la región de Shkodër, al norte de Albania, sobre una explotación de 18 cabras. Pocos días más tarde, se produjo la confirmación de 4 nuevos focos en las regiones de Dibër (a 82 km del foco primario), Bulqizë, Skrapar y Tirana. En total se notificaron 14 focos en 2025 con un total de 1.220 cabras, 928 ovejas y 266 animales pertenecientes a rebaños mixtos de ambas especies afectados. En muchos de los casos, el vínculo epidemiológico se ha establecido por el uso compartido de pastos comunales.

En 2026 Albania notificó nuevamente focos de PPR. El evento fue notificado a la OMSA el 1 de abril. Hasta la fecha del último informe de seguimiento se han confirmado tres focos, con un total de 336 animales susceptibles (202 caprinos y 134 ovinos) y 96 animales afectados.



Las autoridades albanesas aplicaron las medidas de control previstas, incluyendo restricciones de movimiento, zonificación, sacrificio sanitario, limpieza y desinfección, manteniéndose el origen de la infección como no concluyente.



Mapa focos PPR Albania 202-2026 (hasta 18 junio) (Fuente: ADIS)

4.6. KÓSOVO

Kosovo confirmó su primer foco de PPR en julio de 2025, en una explotación localizada en el municipio de Prizren, concretamente en la localidad de Landovicë. La confirmación fue realizada por el laboratorio veterinario oficial tras la detección inicial de sospechas clínicas en pequeños rumiantes. En septiembre de 2025 se confirmaba un segundo foco en el mismo municipio con 63 cabras susceptibles.

4.7. CROACIA

El 13 de diciembre de 2025, Croacia notificó su primer foco de peste de los pequeños rumiantes (PPR), confirmado en una explotación ovina del municipio de Prgomet, en la región de Split-Dalmacia, al sur del país. La sospecha clínica se originó tras la observación de abortos en los animales, confirmándose posteriormente la infección mediante diagnóstico laboratorial. El foco inicial afectó a un rebaño de 26 ovinos, de los cuales 16 fueron considerados casos.

Durante las semanas siguientes se notificaron nuevos focos epidemiológicamente relacionados en explotaciones de ovinos y caprinos localizadas principalmente en el



municipio de Prgomet y sus alrededores, dentro de la misma zona restringida. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se confirmaron seis focos en esta región, afectando a explotaciones de pequeño tamaño y con clara vinculación epidemiológica.

En junio de 2026 se notificaron tres nuevos focos en la región de Bjelovar-Bilogora, concretamente en los municipios de Daruvar y Čazma, situados en el centro del país y geográficamente separados de los focos iniciales de Split-Dalmacia. Estos brotes afectaron exclusivamente a explotaciones ovinas, con un total de 1.596 animales susceptibles y 23 casos confirmados. En las explotaciones afectadas se observaron signos clínicos compatibles con PPR, incluyendo fiebre, diarrea y neumonía, además de mortalidad previa a la confirmación. Dos de las explotaciones presentaban vínculo epidemiológico directo.



Mapa focos PPR Croacia 2025-2026 (hasta 18 junio) (Fuente: ADIS)

5. ACTUACIONES EN LA UE

La UE exige a los Estados miembros disponer de sistemas de vigilancia activa y pasiva para facilitar la detección precoz de la enfermedad, especialmente en zonas de riesgo. Los Estados deben contar, asimismo, con un plan nacional de contingencia actualizado, que incluya equipos veterinarios de intervención rápida y protocolos de actuación claramente definidos.



El control de fronteras es otro pilar fundamental. Se prohíbe la importación de animales y productos susceptibles desde países donde la enfermedad está presente, salvo que se cumplan requisitos sanitarios específicos. Todos estos controles se realizan en los puestos de control fronterizos autorizados.

En caso de brotes, la Comisión Europea adopta decisiones de ejecución que recogen las medidas de emergencia específicas para cada país afectado. Estas decisiones detallan las zonas geográficas implicadas, las restricciones aplicables y las condiciones de vigilancia y seguimiento, y se actualizan en función de la evolución epidemiológica.

Las últimas Decisiones publicadas por la UE para contemplar las medidas de emergencia por la peste de los pequeños rumiantes son:

- Decisión de Ejecución (UE) 2025/269 de la Comisión, de 4 de febrero de 2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/3238, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Bulgaria.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/384 de la Comisión, de 20 de febrero de 2025, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Hungría y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2025/255.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/497 de la Comisión, de 11 de marzo de 2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/3238, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Bulgaria.
- Decisión de Ejecución (UE) 2026/1387 de la Comisión, de 17 de junio de 2026, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Rumanía y por la que se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2025/638.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/784 de la Comisión, de 14 de abril de 2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/3238, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Bulgaria.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/1250 de la Comisión, de 19 de junio de 2025, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2025/638, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Rumanía.
- Decisión de Ejecución (UE) 2025/2663 de la Comisión, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en



Croacia, adoptada tras la confirmación de los primeros focos en el país en diciembre de 2025.

- Decisión de Ejecución (UE) 2026/128 de la Comisión, de 15 de enero de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2025/2663 relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Croacia.
- Decisión de Ejecución (UE) 2026/317 de la Comisión, de 5 de febrero de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2025/2663 relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la peste de los pequeños rumiantes en Croacia.

6. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN OTROS PAÍSES AFECTADOS

6.1. ARGELIA

Como en otros países del Magreb, la PPR es una enfermedad endémica en Argelia, que desde comienzos del año 2018 ha comunicado a la OMSA 125 focos de PPR afectando en total a 2.877 ovinos y 523 caprinos.

AÑO	Nº FOCOS	Nº OVINOS AFECTADOS	Nº CAPRINOS AFECTADOS
2018	26	136	857
2019	80	336	1.887
2020	0	0	0
2021	1	35	0
2022	18	16	133
TOTAL	125	523	2.877

Focos PPR Argelia años 2018-2022 (fuente: OMSA)

Desde comienzos de 2023 y hasta el presente informe, Argelia no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de PPR en su territorio.

6.2. ISRAEL

La PPR apareció por primera vez en Israel en 1993. La ruta de introducción no se ha establecido, aunque muy probablemente pudo llegar del Líbano. Desde entonces la enfermedad se ha hecho endémica y ha sido controlada principalmente mediante campañas masivas de vacunación.

Entre 2018 y 2023 Israel ha comunicado a la OMSA 37 focos de PPR afectando en total a 1.279 animales de diferentes especies.



AÑO	Nº FOCOS	Nº ANIMALES AFECTADOS								
		Caprinos	Gacela dorcas	Gacela Idmi	Gamo	Ibice de Nubia	Jabalí	Orix de Arabia	Ovinos	Ovinos y caprinos (Rebaño mixto)
2018	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2019	21	100	0	1	1	0	13	0	143	30
2020	2	0	1	0	0	0	4	1	20	0
2021	5	371	0	0	0	0	0	0	211	0
2022	2	0	0	0	0	0	0	0	181	0
2023	2	0	0	0	0	0	0	0	200	0
TOTAL	37	471	1	1	2	0	18	1	755	30


Focos PPR Israel años 2018-2023 (fuente: OMSA)

Durante el año 2024 se notificó un único foco de Peste de los Pequeños Rumiantes en Israel, localizado en la región de HaZafon, que afectó a un total de 1.688 ovinos y 25 caprinos. Según la información comunicada a la OMSA, los signos clínicos se observaron únicamente en corderos de entre 3 y 5 meses de edad, describiéndose hinchazón de la cabeza, abundante secreción purulenta nasal y lesiones neumónicas observadas en necropsia. Todos los animales afectados carecían de vacunación previa, mientras que los animales vacunados presentes en la explotación no mostraron signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Durante 2025 y hasta junio de 2026 la situación epidemiológica evolucionó con la notificación de 5 nuevos focos en las regiones de HaZafon y HaDarom, afectando tanto a explotaciones ovinas como caprinas y rebaños mixtos. De acuerdo con los datos más recientes remitidos a la OMSA, los focos notificados afectaron a un total aproximado de 3.700 pequeños rumiantes, incluyendo 1.860 caprinos, 1.140 ovinos y 700 animales pertenecientes a rebaños mixtos.

Entre los signos clínicos descritos en los distintos focos destacan diarrea, diarrea sanguinolenta, secreción nasal, tos, fiebre alta, debilidad, disminución de la producción láctea, disminución de la ingesta, lagrimeo e infección ocular. En algunos brotes se notificaron elevadas mortalidades en corderos y cabritos. Asimismo, la vacunación parece haber influido de forma significativa en la epidemiología de la enfermedad, ya que varios de los rebaños afectados carecían de vacunación previa.

En el siguiente mapa se muestra de manera más específica la localización de los focos notificados en 2024, 2025 y 2026 (hasta 18 junio), indicando en verde los focos cerrados.



Mapa focos PPR Israel 2024, 2025 y 2026 (hasta 18 junio) (Fuente: OMSA)

6.3. LIBIA

La PPR es una enfermedad endémica en Libia, que desde el año 2016 ha comunicado a la OMSA 24 focos afectando en total a 2.908 ovinos y caprinos.

Año	Nº focos	Nº animales afectados		
		Ovinos	Caprinos	Ovinos/Caprinos (rebaño mixto)
2016	5	1.043	0	0
2017	6	405	0	0
2018	5	874	0	0
2019	1	0	0	179
2020	7	140	210	57
Total	24	2.462	210	236

Focos PPR Libia años 2016-2020 (fuente: OMSA)



Desde comienzos de 2021 y hasta el momento del presente informe, Libia no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de PPR en su territorio.

6.4. MARRUECOS

El 7 de febrero de 2020 Marruecos comunicó a la OMSA un nuevo brote con la confirmación de un foco en una explotación con un censo de 140 caprinos, entre los que hubo 92 animales afectados (incluidos 68 muertos), localizada en la región de Tánger-Tetuán-Al Hoceima, al norte del país. El 17 de febrero de 2020 Marruecos comunicó a la OMSA un nuevo foco en 10 caprinos de una explotación con un censo de 35 caprinos y 2 ovinos, localizada en la misma región.

El 12 de mayo de 2020 Marruecos notificó a la OMSA un nuevo foco de PPR, esta vez localizado en el centro del país, afectando a un caprino de una explotación con un censo de 135 caprinos y 94 ovinos.



Mapa foco Marruecos febrero-mayo 2020

Se llevó a cabo una campaña nacional de vacunación contra la peste de pequeños rumiantes y la viruela ovina del 17 de enero al 20 de mayo de 2020 en la que más de 22,5 millones de ovejas y cabras fueron vacunadas contra la PPR.

El brote fue declarado resuelto con fecha de cierre el 21 de mayo de 2020.

El 8 de octubre de 2021 Marruecos comunicó a la OMSA un nuevo brote de PPR en su territorio con la confirmación de un foco en una explotación en Casablanca-Settat, afectando a 5 ovinos de un total de 700 censados. En total, desde el inicio del brote hasta el 19 de diciembre de 2022, fecha en la que fue declarado resuelto el evento, fueron notificados 13 focos (7 en 2021 y 6 en 2022) afectando a 56 caprinos y 109 ovinos.



Mapa focos Marruecos años 2021 y 2022

Desde comienzos de 2023, Marruecos no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de PPR en su territorio. El transporte marítimo de animales vivos representa uno de los principales riesgos de introducción de la PPR en Europa.

6.5. TÚNEZ

La PPR apareció por primera vez en Túnez en 2008 y, como en otros países del Magreb, es una enfermedad endémica.

Desde el año 2016 Túnez ha comunicado a la OMSA 278 focos de PPR afectando en total a 7.022 ovinos y caprinos.

Año	Nº focos	Nº animales afectados		
		Ovinos	Caprinos	Ovinos/Caprinos (rebaño mixto)
2016	86	1.886	628	0
2017	31	881	215	545
2018	10	250	25	158
2019	33	127	19	1.182
2020	12	141	2	256
2021	9	121	22	57
2022	10	298	21	0
2023	8	132	33	0
Total	199	3.836	965	2.198

Focos PPR Túnez años 2016-2023 (fuente: OMSA)



Desde comienzos de 2024 Túnez no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de PPR en su territorio.

6.6. TURQUÍA

La PPR es actualmente endémica en Turquía y supone, junto con Marruecos, el mayor riesgo de entrada de la enfermedad en Europa. La principal vía de entrada de PPR en Europa desde Turquía podría ser por la transmisión a través de los animales salvajes y como punto de intenso comercio y tránsito transfronterizo de pequeños rumiantes de países endémicos.


No se ha registrado ningún caso de PPR en la región de Tracia desde el año 2013, donde todos los pequeños rumiantes son vacunados frente a PPR desde ese año.

Desde comienzos del año 2019 hasta el 20 de marzo de 2026, Turquía ha comunicado a través de ADIS 471 focos de PPR afectando en total a 16.336 ovinos y 1.552 caprinos. No se han comunicado por el momento casos en 2026.

Año	Nº focos	Nº Caprinos afectados	Nº Ovinos afectados
2019	218	340	7.576
2020	106	608	3.710
2021	88	372	3.548
2023	6	0	72
2024	38	218	1.412
2025	4	14	18
Total general	460	1.552	16.336

Focos PPR Turquía años 2019-2025 (fuente: ADIS)

A continuación, se muestra la distribución espacial de los focos confirmados por Turquía desde 2019.



Mapas focos Turquía años 2016-2025 (Fuente: ADIS)

Hasta el 18 de junio de 2026, no se han notificado nuevos focos de la enfermedad en el país.

7. DETECCIÓN DE PPR EN CAMELLOS



Existe un precedente de PPR en camellos descrito en 2004 en Sudán. Entre agosto y octubre de 2004, coincidiendo con el movimiento estacional de los animales en busca de pastos verdes en otoño, se produjo en Sudán un brote de una enfermedad mortal hasta entonces desconocida en camellos, cuyo agente causal resultó ser el virus de PPR. La enfermedad causó muerte súbita, sobre todo en hembras gestantes y recientemente paridas, diarrea y aborto. La tasa de mortalidad osciló entre el 0% y el 50% con una media del 7,4%.

En mayo de 2016 se publicó un estudio sobre el primer brote de PPR detectado en camellos en Irán en 2013. A mediados de julio de 2013, se observó un brote de PPR en un rebaño de camellos tras ser importados desde Kuwait a la provincia de Khuzestan, en el suroeste de Irán. Los signos clínicos de los animales afectados incluían muerte súbita, fiebre, erosión oral, y lesiones similares a las de ectima, diarrea amarillenta, neumonía y dificultad respiratoria, hipertrofia de ganglios linfáticos, deshidratación severa, dermatitis, queratitis ulcerativa, y conjuntivitis. Los hallazgos de la necropsia incluyen queratoconjuntivitis, congestión y consolidación del pulmón, palidez del hígado, y ampliación y edema de los ganglios linfáticos. El examen histopatológico reveló degeneración e hiperemia aguda de los pulmones, degeneración grasa y focos necróticos en el hígado, necrosis tubular en los riñones y dermatitis necrótica. Se utilizó el ELISA para confirmar el VPPR y diferenciarlo del virus de la peste bovina (VPB). Después, el genoma del virus se estudió mediante análisis molecular para identificar la cepa y la subcepa del virus. Todas las muestras reaccionaron positivamente al ELISA de Inmunocaptura frente a antígenos del VPPR. Además, los resultados de la RT-PCR en pulmones y ganglios linfáticos de los camellos muertos confirman la PPR como la causa de la enfermedad.

Este primer informe de PPR en un rebaño de camellos en Irán podría ser una alarma importante sobre la propagación de la enfermedad a otros hospedadores inusuales si los movimientos de los animales, las cuarentenas y las vacunaciones periódicas se descuidan.

Los últimos estudios serológicos llevados a cabo en Irán (Serological Survey of Antibodies Against PPR Virus in Camels (*Camelus dromedarius*) in Khorasan Razavi Province, Iran. *Vet Med Sci.* 2025) determinan que la resistencia y sensibilidad de los camellos frente a esta enfermedad aún no se ha determinado completamente y requiere más estudios. Sin embargo, factores de riesgo asociados al estrés, como el transporte, podrían contribuir a la aparición de formas clínicas de PPR en camellos. La detección de anticuerpos frente al virus de la PPR en camellos en este estudio pone de manifiesto que estos animales podrían ser contribuyentes significativos a la epidemiología de la PPR en Irán.

El 21 de mayo de 2016 se notificó una enfermedad letal no diagnosticada en dromedarios en Pakistán, país vecino al este de Irán, cuya población de camellos se estima en un millón de animales y ocupa el sexto puesto a nivel mundial. La PPR fue una de las principales sospechas, aunque se está a la espera de más información.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DG Sanidad de la Producción
Agroalimentaria y Bienestar Animal

SG Sanidad e Higiene Animal y
Trazabilidad