



BONITO

BON

Sarda sarda (Bloch, 1793)



Nombres **FAO**: **es** bonito del Atlántico
fr bonite à dos rayé
en atlantic bonito



Talla (cm)	Caladeros			Edad de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-		
comercial	-	-	-	40	

LONGITUD MÁXIMA: 90 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, fusiforme y ligeramente comprimido. Cabeza puntiaguda. El tamaño más común oscila entre los 60 y los 80 cm.

Los ojos son pequeños y redondeados, con anillos óseos alrededor de la cavidad ocular. La boca es grande en comparación con el resto del cuerpo. La mandíbula superior es algo prominente, no retráctil, y alcanza la parte posterior del ojo.

Posee dos aletas dorsales que se sitúan muy próximas entre sí. La primera tiene entre 20 y 23 radios duros, y es larga y de perfil inclinado y recto, excepto en la parte anterosuperior donde es cóncava. Tras

la segunda dorsal se sitúan 7-9 pínulas de pequeño tamaño que alcanzan el inicio de la cola. Las aletas pectorales son triangulares y cortas, y cuentan con 23-26 radios. Las aletas ventrales son pequeñas, con dos lóbulos entre ellas. La aleta anal es corta (2 radios duros y 11-15 radios blandos) y está seguida de 6-8 pínulas que se disponen de forma casi simétrica a las del dorso. La aleta caudal es ahorquillada y potente, y está dotada de una fuerte quilla situada entre otras dos más pequeñas que se encuentran a cada lado del pedúnculo caudal.


Especies con caracteres semejantes:
Sarda orientalis (bonito mono)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	bonito del sur
Asturias	sierra, rayado
Canarias	sierra, corriguelo
Cataluña	bonítol
Baleares	bonítol, bonitol
Com. Valenciana	bonítol
Galicia	alistado
País Vasco	aginzorrotz, lampo sabelmarradun

Descripción General

Coloración llamativa. El dorso y la zona superior de los flancos son de color azul acerado, con el que contrastan el vientre y la zona inferior de los flancos, que son plateados. A ambos lados de la zona dorsal se sitúan siete o más bandas oblicuas de color oscuro. Las aletas, salvo las ventrales que son blanquecinas, son oscuras. Las pínulas son grisáceas.



El coselete está cubierto por escamas de tamaño mediano, mientras que en el resto del cuerpo se sitúan escamas pequeñas. La línea lateral es ondulada.

Posee párpados adiposos poco desarrollados. Tanto la lengua como ambas mandíbulas están provistas de pequeños dientes cónicos, al igual que el resto de las especies de esta familia. En el primer arco branquial se sitúan entre 8 y 27 branquispinas. No posee vejiga natatoria.

Hábitat y comportamiento



Es una especie típicamente pelágica y superficial, aunque puede encontrarse a profundidades de 200 m. Vive en un rango amplio de temperaturas (12-27°C) y puede soportar salinidades muy bajas, lo

que le permite adentrarse en zonas estuáricas.

Es un nadador muy activo, lo que le permite realizar migraciones estacionales muy marcadas, acercándose a la costa para reproducirse.

Tiene hábitos gregarios, y forma grupos constituidos por un gran número de individuos.

Su metabolismo es muy alto, lo que le permite un crecimiento rápido y el mantenimiento de la temperatura corporal favoreciendo que sea un pez rápido y ágil. A su gran capacidad natatoria contribuyen también la potente aleta caudal y las pínulas, que ayudan a estabilizar la natación.

Caza cerca de la superficie, llegando a saltar sobre el agua cuando van en busca de sus presas. Su dieta es variada pero se centra siempre en presas pelágicas, como sardinas, anchoas y otros pequeños peces, incluyendo juveniles de su propia especie. Los ejemplares más pequeños se alimentan sobre todo de calamares y crustáceos, mientras que los adultos capturan casi exclusivamente peces.

Distribución



Se encuentra en ambas vertientes del Atlántico. En el Atlántico oriental se encuentra desde Escocia y el mar del Norte hasta Sudáfrica, incluidos el mar Mediterráneo y el mar Negro. En el Atlántico occidental se captura desde Nueva Escocia al Río de la Plata, aunque su presencia en el mar Caribe es escasa.


Reproducción

La madurez se alcanza cuando miden unos 40 cm. La puesta se realiza en primavera y verano. No obstante, y como ocurre con la mayor parte de especies con amplia distribución latitudinal, los ejemplares que viven en aguas más cálidas suelen realizar la puesta durante periodos más amplios. Dicha puesta no tiene una intensidad continua, sino que presenta máximos que varían según las zonas. Por ejemplo, en las costas de Senegal los máximos son en enero y abril, mientras que en las costas marroquíes son en junio-julio.

Durante el desove, que tiene lugar en aguas cálidas cercanas a la costa, los individuos se concentran formando bancos. Cada hembra pone unos 400.000 huevos. Tanto éstos últimos como las larvas son pelágicos.

Es una especie de crecimiento rápido, cuya edad máxima apenas supera los 5 años.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura con una gran variedad de artes, entre las que destacan los trasmallos, el anzuelo y el cerco preferentemente.

Comercialización

Carne muy apreciada; muy sabrosa, fácilmente digerible y muy nutritiva. Se comercializa fresca, congelada, en conserva y en semiconserva.

Se desembarca principalmente fresco y entero. También congelado entero o transformado a bordo (eviscerado y sin cabeza).

