



Bothus podas (Delaroche, 1809)



Nombres **FAO**: es podas
fr rombou podas
en wide-eyed flounder



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 45 cm

Caracteres más significativos:

Cuerpo ovalado, extremadamente alto y plano. Los dos ojos se encuentran en el lado izquierdo de la cabeza.

La longitud más común se encuentra entre 8 y 18 cm.

Existe un cierto dimorfismo sexual, de manera que en los machos maduros el perfil anterior de la cabeza es casi vertical, con una ligera muesca delante del ojo inferior. Además, estos presentan una espina en el extremo de la mandíbula superior y una o dos espinas más pequeñas delante de los ojos.

Los ojos son protuberantes, y están separados por un espacio muy amplio; el ojo inferior se encuentra ligeramente adelantado respecto al superior.

La aleta dorsal se inicia delante del ojo

inferior, y finaliza en el pedúnculo caudal. También aquí finaliza la aleta anal, que comienza a la altura de las aletas pectorales

y está precedida por una espina pequeña. La base de las aletas ventrales tiene longitud desigual, siendo mayor en el lado ocular que en el ciego. Las aletas pectorales tienen pequeño tamaño.

Especies con caracteres semejantes:

Arnoglossus imperialis (peluda imperial)

Arnoglossus kessleri (peluda)


Arnoglossus laterna (serradell)

Arnoglossus thori (peludilla)

Nombres Comerciales y Locales	
Andalucía	roagallo, rodaballo, tapaculo
Baleares	padás, pedaç, pedas, pedás, pedazo, podás
Canarias	tapaculo, tapaculos
Cataluña	pedaç, puput, remol, rèmol, tacó, tapaculs
C.Valenciana	remol, rodaballo
Galicia	rapapelos de ollos grandes
Murcia	pedas, remol

Descripción General

El color del lado ocular es variable, dependiendo del fondo sobre el que vive; suele oscilar entre marrón y tonos grisáceos o negruzcos, y generalmente está



cubierto de manchas más claras distribuidas de forma dispersa. El lado ciego es blanco-azulado. La línea lateral presenta en ocasiones una mancha oscura difusa en la unión de las partes curva y rectilínea, y otra sobre la mitad de la parte recta.

Todo el cuerpo está cubierto de escamas, que son ctenoideas en el lado ocular y cicloideas en el lado ciego. La línea lateral está presente solo en la cara ocular, siendo rectilínea a lo largo de toda su longitud, excepto sobre la aleta pectoral, donde se curva; la subespecie *B. podas podas* tiene 75-86 escamas sobre esta línea lateral, y la subespecie *B. podas maderensis* tiene alguna más, entre 88 y 91.

La boca está provista de dientes de pequeño tamaño en ambas mandíbulas.

Hábitat y comportamiento



Especie bentónica que vive sobre sustratos arenosos o fangosos de la plataforma continental, a una profundidad comprendida entre 15 y 400 m.



Tiene la capacidad de cambiar su coloración según el tipo de fondo en el que se encuentre, de manera que se mimetiza con el entorno y pasa desapercibido para presas y depredadores.

Es un pez bastante curioso que a menudo sigue a otros peces de fondo e incluso estrellas de mar. Se alimenta de pequeños peces e invertebrados.

Distribución



Existen dos subespecies muy características, de las que *B. podas podas* se distribuye por el Mediterráneo, el Adriático y parte del Atlántico oriental, desde las costas de Marruecos hasta las de Angola, mientras que *B. podas maderensis* es propia de Madeira y Canarias.

Reproducción

Especie ovípara con fecundación interna.

La reproducción tiene lugar entre mayo y agosto, extendiéndose este periodo hasta septiembre en las Azores.

Los huevos y las larvas son pelágicos; éstas son similares a las de cualquier otro pez, con un ojo a cada lado, y se caracterizan porque son muy transparentes, excepto en el extremo caudal, donde existe una agrupación de melanóforos. Tras algunas semanas, el ojo derecho se desplaza a la superficie izquierda, y el cuerpo se va aplanando. La larva continua nadando libremente hasta que alcanza una longitud aproximada de 3 cm, desplazándose entonces al fondo, donde comienza la vida bentónica.

Artes de Pesca

Se captura con arrastre y artes de enmalle de fondo.

Comercialización

Su carne es apreciada, pero se suele consumir a nivel local. Se desembarca fresco, tanto entero como eviscerado.

