


SARGO BREADO

SBZ

Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838)



Nombres **FAO**: **es** sargo breado
fr sar à grosses lèvres
en zebra seabream



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	←H
mínima	-	15 (7)	-	33	27
comercial	-	-	-		

LONGITUD MÁXIMA: 60 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo ovalado, alto y comprimido. El perfil del dorso es convexo a partir de la cabeza, formando una especie de joroba que tiende a acentuarse con la edad. El tamaño más común oscila entre 20 y 25 cm.

Cabeza grande, con característicos morro cónico y labios carnosos. Boca ligeramente protráctil; en la parte anterior presenta dientes incisivos, seguidos de varias filas de molariformes bien desarrollados. Borde preopercular liso.

Tiene una mancha oscura que va de lado a lado de la cabeza, de mejilla a mejilla, pasando por los ojos a modo de antifaz. Las bandas transversales de los flancos son más anchas que las interbandas.

Tiene una sola aleta dorsal, con 11-12 espinas y 11-14 radios blandos. Las aletas pectorales son largas y acabadas en punta; todos sus radios son blandos. Ventrals en posición avanzada, con 1 espina y 5 radios blandos. La aleta anal de base corta con 3 radios duros y 10-12 radios blandos. Aleta caudal ahorquillada.

Especies con caracteres semejantes

Diplodus puntazzo (sargo picudo)

Diplodus sargus (sargo)


Diplodus vulgaris (mojarra)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	pejeladrillo, sargo, sargo soldado
Asturias	bizcuervo, bizcuervu, mojarra, mujarra, pizcuervu
Canarias	molinero, sargo breao, sargo briao, zapatera
Cantabria	bedao, mocharra, mojarra, monjón, monterodo, mujarra, pañosa
Cataluña	rom, sard imperial, sard reial, sard soltat, sarg imperial
Com. Valenciana	sard imperial, sarg real, sargo real
Galicia	bedao, mocharra, mucharra, sargo acastañado
País Vasco	muxar ezipainlodi

Descripción General

Cuerpo plateado pero con irisaciones de color dorado. Región ventral blanquecina. Flancos con 5 anchas bandas transversales de color marrón chocolate. La cabeza tiene una mancha oscura que va de una mejilla a otra pasando por los ojos como un antifaz. Parte delantera del hocico oscura y manchas suboculares amarillas.



Cuerpo totalmente recubierto de escamas cicloideas, grandes y visibles. Línea lateral cubierta por 51-62 escamas.

Presenta una dentición importante: de 10 a 12 incisivos en la mandíbula superior y 8 en la inferior; con un par de hileras de molares justo detrás, pero netamente separadas de los incisivos.

Hábitat y comportamiento



Especie nectobentónica típicamente litoral. Normalmente se encuentra a cierta profundidad entre 10 y 50 m, aunque puede llegar a alcanzar los 300 m. Por lo general, habita sobre fondos rocosos,

aunque se puede encontrar también sobre sustratos fangosos.

Los juveniles viven en zonas poco profundas cercanas a la costa y se dirigen a mayor profundidad cuando alcanzan la edad adulta.

Normalmente nada en solitario cerca del fondo, si bien en los lugares en donde abunda, puede formar bancos de varios individuos de talla similar que se agregan a una cierta distancia del fondo. No se trata de un pez especialmente desconfiado.

Es el menos frecuente de los sargos, aún en aquellos fondos en los que se puede considerar abundante.

Especie omnívora, que se alimenta de invertebrados bentónicos (crustáceos, moluscos y poliquetos), aunque también se alimenta de algas en gran proporción.

Distribución



Distribución atlántica. Se encuentra desde el Cantábrico hasta las costas de Sudáfrica (si bien en este caso se trata de la subespecie *D. cervinus hottentotus*), incluidas las islas Canarias y Madeira. Está ausente de Cabo Verde, el Senegal y el golfo de Guinea. En el Mediterráneo era abundante sobre todo en la mitad meridional de la cuenca, pero es notoria

la progresiva colonización de esta especie de las aguas más septentrionales del golfo de León (en donde estaba prácticamente ausente a principios de los años 80). Este fenómeno parece estar relacionado con el progresivo calentamiento de las aguas de esta zona.

Reproducción

Se trata de una especie hermafrodita proterogónica, que primero madura como hembra a los 4 años de edad y posteriormente, a los 5 años, madura como macho.

La época de reproducción varía en función de la latitud, de mayo a junio en Canarias y, seguramente, en marzo y abril en el Mediterráneo.


Durante la freza se reúnen varias hembras y un macho dominante. Los huevos y las larvas son pelágicos.

En el Mediterráneo el asentamiento de las post-larvas ocurre entre mayo y junio y de octubre a enero en Canarias. Los juveniles se asientan sobre fondos someros, abrigados y de pendiente suave, principalmente en sustratos mixtos de guijarro y arena. Durante esta época de asentamiento comparten hábitat con los juveniles de *D. sargus* (sargo), pero se segrega de ellos al ocupar un hábitat algo más profundo. Al principio de esta fase la mortalidad es muy elevada a consecuencia de los depredadores.

Cuando los jóvenes sargos abandonan la zona de *nursery* se mantienen a poca profundidad, cerca de la línea de costa, para integrarse luego en el hábitat adulto.

El sargo breado es considerado como una de las especies indicadoras del efecto de la protección en reservas marinas, ya que en ellas puede alcanzar una abundancia y unas tallas no comunes en las zonas de pesca: puede superar los 60 cm de longitud, pesar más de 5 kg de peso y sobrepasar los 17 años de edad.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

Se captura con los mismos artes empleados para la captura de los otros sargos: palangre, redes de enmalle y nasas. La presencia de sargos en las capturas de arrastre es un signo de que se ha arrastrado a profundidades inferiores a las permitidas.

El tamaño que puede llegar a alcanzar esta especie la hace especialmente interesante para los pescadores tanto deportivos como submarinos.

Comercialización

La calidad gastronómica de este pez no es comparable a la de los mejores espáridos, sin embargo, es más que aceptable y especialmente apreciada cuando su tamaño supera los 20 cm.

Se desembarca y comercializa fresco y entero.

