

Alegrillo Negro



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula-débil Densidad débil-baja

Pámpano:



<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula-baja en el nudo Nula-baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-media
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Débil-media entre nervios Nula-media sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande-muy grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Plano-alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos entre ligeramente y muy superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente-débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Laxa-media
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Alta-muy alta
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo corto-ligeramente más corto con densidad baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña-mediana



Alegrillo Negro



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-medio
<i>Compacidad</i>	Muy compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto-muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-muy pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Regular
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada-angulosa

Fenología:

Época de desborre: precoz-media

Época de maduración: temprana

Potencial enológico:

- Vinos alcohólicos (12,8°) con una acidez alta.