

# Bobal



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media densidad entre media-alta

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Media-alta en el entrenudo

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte-muy fuerte

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Orbicular
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Superpuestos en V
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial-media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Alta
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula-débil
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña



# Bobal



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Mediano-grande
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul negra
<i>Forma de perfil</i>	Esférica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	No coloreada
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón
<i>Relieve superficie</i>	Estriado

## **Fenología:**

Época de desborre: medio-tardío

Época de maduración: medio-tardío

## **Aptitudes agronómicas:**

- Planta vigorosa, porte semierguido.
- Fertilidad alta, producción media alta, racimos grandes.
- Muy resistente a sequía, se adapta mejor a suelos sueltos y aireados. Se adapta bien a podas cortas.
- Sensible a oídio y botrytis.

## **Potencial enológico:**

- Vinos alcohólicos, color intenso, cereza oscuro con tonos violáceos, aroma ligero con tonos herbáceos, acidez media, vino áspero con gran contenido de taninos.
- Se empleaba como vino de pasto para mezclar con Airén, en la actualidad se están obteniendo buenos resultados en la elaboración de rosados frescos y afrutados.

