

Emerald Seedless



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación débil
Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Baja en nudos
Baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja entre nervios
Nula o muy baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Grande

Forma del limbo Pentagonal-deltaide

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Cerrados

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Alabeado

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos ligeramente superpuestos

Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja


Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes a ambos lados convexos de longitud medios-largos y con relación longitud-anchura mediana-grande



Emerald Seedless



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Suelto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Media
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica corta
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Rudimentarias

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillento-marrón Amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: temprana-media

Época de maduración: tardía

Aptitudes agronómicas:

- Fertilidad débil. Productividad baja.
- Baya de tamaño mediano.

Potencial enológico:

- Variedad de mesa.
- Variedad de piel espesa.