

# Gamay Noir



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación débil  
Densidad media

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Color nudo* Rojo en la cara dorsal  
Verde con rayas rojas en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Nula o muy baja en nudos  
Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales* Nula o muy débil

*Densidad pelos tumbados* Baja entre nervios  
Nula o muy baja sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Pequeño-medio

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Tres

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Medio abiertos

*Hinchazón del haz* Débil

*Perfil en sección transversal* Plano y alabeado

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad superficial con lóbulos abiertos-cerrados

*Pigmentación del haz* Ausente o muy débil

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Nula o muy bajo


*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes rectilíneos de longitud medios con relación longitud-anchura pequeña



# Gamay Noir



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Pequeño-mediano
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Muy corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Muy pequeña-pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Violeta oscura-azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica ancha
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

## **Fenología:**

**Época de desborre:** precoz

**Época de maduración:** temprana

## **Aptitudes agronómicas:**

- Porte semierguido, buena fertilidad. Tiende a agotarse en condiciones de gran fertilidad y climas calurosos.
- Vigor medio, le conviene una poda corta. A veces sensible a millerandage.
- Adaptada a suelos graníticos. Es sensible al asurado. Emite muchos agraces.
- Sensible al oídio, mildiu, black-rot y botrytis.

## **Potencial enológico:**

- En suelo granítico da un vino afrutado, fino con rendimiento inferior a 50 hl.
- Se obtienen vinos afrutados, pobres en taninos y poco aromáticos.
- Variedad utilizada para los típicos Beaujolais.