

Graciano



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media
Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Media

Densidad pelos tumbados Media-densa entre nudos
Baja sobre nudos

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abiertos-ligeramente superpuestos

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Plano bordes hacia el envés

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos cerrados-ligeramente superpuestos


Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Media

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Baja

Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo Pecíolo ligeramente más largo que el nervio principal con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes con ambos lados rectilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana



Graciano



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto-medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Estérica
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Lisa

Fenología:

Época de desborre: media-tardía

Época de maduración: tardía

Aptitudes agronómicas:

- Variedad vigorosa de porte erecto y desborre tardío.
- Resistente a la sequía. Difícil de cultivar. Baja fertilidad y productividad.
- Prefiere suelos arcillosos, calcáreos, de relativa frescura. Poda corta.
- Resistente al mildiu y bastante a oídio.

Potencial enológico:

- El mosto fresco de color rojo muy vivo se degrada rápidamente debido a la tendencia a la oxidación.
- El vino tiene sabor a regaliz, carácter tánico y es algo amargo. Rico en sustancias pécticas que dificultan la clarificación.
- Vinos: de crianza, reserva y gran reserva.

