

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01462 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 29/09/2023 **Renovación:** **Caducidad:** 31/01/2027
Nombre Comercial: MIKONOS

Titular

SIPCAM INAGRA S.A.
 C/ Prof. Beltrán Bágüena 5. Edificio Nuevo Centro
 46009
 (Valencia)
 ESPAÑA

Fabricante

SIPCAM INAGRA S.A.
 C/ Prof. Beltrán Bágüena 5. Edificio Nuevo Centro
 46009
 (Valencia)
 ESPAÑA

Composición

FOSFONATOS DE POTASIO 51% (Exp. como ácido fosforoso) [SL] P/V

Envases

Uso profesional:

- Botellas/garrafas HDPE/COEX de 60 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 10 L.
- Garrafas HDPE de 20 L y 50 L.

NOTA: Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Uso no profesional:

- Botellas de 60 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL de HDPE/COEX, del tipo separate measure (medida separada) o Integral squeeze to fill (medida en el envase).

NOTA: Para los envases destinados a uso no profesional, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Achicoria (hojas)	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Aguacate	Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	0,75 - 3,75 l/ha	3	10 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 59-67, o bien BBCH 71- 85.
Albahaca	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.

Apio	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar durante BBCH 12-49.
Arándano, mirtilo	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Barbarea	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Berro, mastuerzo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Canónigo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Caqui	Alternariosis de la remolacha, Alternaria alternata	0,45 - 2,5 l/ha	3	15 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 76-89.
Cebollino	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Diente de león	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Escarola	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Estragón	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Frambueso	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Grosellero	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Laurel	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.
Lima	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar desde BBCH 40.
Limonero	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mostaza china	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	1,2 - 2,5 l/ha	3	10 días	800 - 1000 l/ha	(Aceituna de mesa y producción de aceite). Aplicar durante BBCH 11-81.
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.
Perejil	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Perifollo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Piña Tropical	Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	4,5 - 6 l/ha	2	20 días	3000 - 4000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-79.

Romero	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Salvia	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Tomillo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,75 - 2,5 l/ha	3	10 días	500 - 1000 l/ha	Aplicar desde BBCH 20.
Zarzamoras	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Achicoria (hojas)	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Aguacate	Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	0,75 - 3,75 l/ha	3	10 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 59-67, o bien BBCH 71- 85.
Albahaca	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Apio	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar durante BBCH 12-49.
Arándano, mirtilo	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Barbarea	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Berro, mastuerzo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Canónigo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Caqui	Alternariosis de la remolacha, Alternaria alternata	0,45 - 2,5 l/ha	3	15 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 76-89.
Cebollino	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Diente de león	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Escarola	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Estragón	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Frambueso	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Grosellero	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Laurel	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.

Lima	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar desde BBCH 40.
Limonero	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Phytophthora spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mostaza china	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	1,2 - 2,5 l/ha	3	10 días	800 - 1000 l/ha	(Aceituna de mesa y producción de aceite). Aplicar durante BBCH 11-81.
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.
Perejil	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Perifollo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Piña Tropical	Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	4,5 - 6 l/ha	2	20 días	3000 - 4000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-79.
Romero	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Salvia	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Tomillo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,75 - 2,5 l/ha	3	10 días	500 - 1000 l/ha	Aplicar desde BBCH 20.
Zarzamoras	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Achicoria (hojas)	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Aguacate	Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	0,75 - 3,75 l/ha	3	10 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 59-67, o bien BBCH 71- 85.
Albahaca	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Apio	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar durante BBCH 12-49.
Arándano, mirtilo	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Barbarea	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Berro, mastuerzo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.

Canónigo	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Caqui	Alternariosis de la remolacha, <i>Alternaria alternata</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	15 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 76-89.
Cebollino	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Diente de león	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Escarola	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Estragón	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Frambueso	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Grosellero	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.
Laurel	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.
Lima	<i>Phytophthora</i> spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar desde BBCH 40.
Limonero	<i>Phytophthora</i> spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	<i>Phytophthora</i> spp.	1,5 - 8,75 l/ha	2	20 días	1000 - 3500 l/ha	Aplicar desde BBCH 40.
Mostaza china	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Olivo	Repilo del olivo, <i>Venturia oleaginea</i>	1,2 - 2,5 l/ha	3	10 días	800 - 1000 l/ha	(Aceituna de mesa y producción de aceite). Aplicar durante BBCH 11-81.
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-49.
Perejil	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Perifollo	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Piña Tropical	Mildiu terrestre del tomate, <i>Phytophthora nicotianae</i> var. parasitica Podredumbre de cuello y raíz, <i>Phytophthora cinnamomi</i>	4,5 - 6 l/ha	2	20 días	3000 - 4000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-79.
Romero	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Salvia	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Tomillo	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, <i>Plasmopara viticola</i>	0,75 - 2,5 l/ha	3	10 días	500 - 1000 l/ha	Aplicar desde BBCH 20.
Zarzamoras	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 33-69.

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola

Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 12-89.
Fresal	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Incluye el uso en microtúnel y walk-in tunnel. Aplicar durante BBCH 12-85.
Pimiento	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-89.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-89.

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila

Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 12-89.
Fresal	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Incluye el uso en microtúnel y walk-in tunnel. Aplicar durante BBCH 12-85.
Pimiento	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-89.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, <i>Phytophthora infestans</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 12-89.

Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila

Achicoria (hojas)	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Aguacate	Podredumbre de cuello y raíz, <i>Phytophthora cinnamomi</i>	0,75 - 3,75 l/ha	3	10 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 59-67, o bien BBCH 71- 85.
Albahaca	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Apio	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Producción destinada al consumo de hojas. Aplicar durante BBCH 12-49.
Arándano, mirtilo	<i>Phytophthora</i> spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 33-69.
Barbarea	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Berro, mastuerzo	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Canónigo	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Caqui	Alternariosis de la remolacha, <i>Alternaria alternata</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	15 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 76-89.
Cebollino	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.

Diente de león	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Escarola	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Estragón	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Frambueso	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 33-69.
Grosellero	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 33-69.
Laurel	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Lima	Phytophthora spp.	1,5 - 7 l/ha	2	20 días	1000 - 2800 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Se puede realizar una única aplicación a dosis máx. de 8,75 l/ha y caldo máx 3500 l/ha. Aplicar desde BBCH 40.
Limonero	Phytophthora spp.	1,5 - 7 l/ha	2	20 días	1000 - 2800 l/ha	Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Se puede realizar una única aplicación a dosis máx. de 8,75 l/ha y caldo máx 3500 l/ha. Aplicar desde BBCH 40.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Phytophthora spp.	1,5 - 7 l/ha	2	20 días	1000 - 2800 l/ha	Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Se puede realizar una única aplicación a dosis máx. de 8,75 l/ha y caldo máx 3500 l/ha. Aplicar desde BBCH 40.
Mostaza china	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	1,2 - 2,5 l/ha	3	10 días	800 - 1000 l/ha	(Aceituna de mesa y producción de aceite). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 11-81.
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Perejil	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Perifollo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Piña Tropical	Mildiu terrestre del tomate, Phytophthora nicotianae var. parasitica Podredumbre de cuello y raíz, Phytophthora cinnamomi	4,5 - 6 l/ha	2	20 días	3000 - 4000 l/ha	(Uso menor por jerarquía). Aplicar durante BBCH 10-79.
Romero	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Salvia	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.

Tomillo	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 12-49.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,75 - 2,5 l/ha	3	10 días	500 - 1000 l/ha	Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar desde BBCH 20.
Zarzamoras	Phytophthora spp.	0,45 - 2,5 l/ha	3	10 días	300 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Aplicar con mochila pulverizadora (5l). Aplicar durante BBCH 33-69.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Arándano, mirtilo, Frambueso, Grosellero, Zarzamoras, Fresal	7
Achicoria (hojas), Aguacate, Albahaca, Apio, Barbarea, Berro, mastuerzo, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Canónigo, Cebollino, Diente de león, Escarola, Estragón, Laurel, Lechuga y similares, Lima, Limonero, Mandarino (incluido clementino e híbridos), Mostaza china, Olivo, Patata, Perejil, Perifollo, Romero, Rúcula, Salvia, Tomillo, Vid de vinificación, Berenjena, Pimiento, Tomate	15
Caqui	20
Piña Tropical	30

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento fungicida al aire libre (profesional y no profesional) e invernadero (profesional) por pulverización foliar mecánica (profesional) y manual (profesional y no profesional). En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto. Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615. (*) La etiqueta deberá incluir una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario con respecto a la eficacia o la fitotoxicidad del uso. Los usos menores se identificarán por separado en la etiqueta.

Clase de Usuario



Uso profesional agrario y uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

Profesional aire libre:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 + calzado de protección frente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos.

Profesional en invernadero:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 + calzado de protección frente a productos químicos; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6 + calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Aplicaciones al aire libre:

En la reentrada a los cultivos de limonero, mandarina, lima y vid, el trabajador utilizará durante la reentrada guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado. Los guantes de protección química serán necesarios para tareas de duración superior a dos horas:

- Cítricos: no será necesario el uso de guantes de protección química tras la primera aplicación. Tras la segunda, el uso de guantes será necesario durante 4 días.
- Vid: no será necesario el uso de guantes de protección química tras las dos primeras aplicaciones. Tras la tercera, el uso de guantes será necesario durante 2 días.

En la reentrada al resto de cultivos, el trabajador utilizará durante la reentrada: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

Aplicaciones en invernadero:

El trabajador utilizará durante la reentrada ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo (uso profesional al aire libre e invernadero):

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Medidas de mitigación del riesgo (uso NO profesional al aire libre):

- No entrar en contacto con las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.
- Se debe hacer uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.
- Durante el manejo de los cultivos tratados, se debe hacer uso de ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños (únicamente para los envases destinados a uso no profesional).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales



SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial para manejar el riesgo de eutrofización.

SPE 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para uso no profesional.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad (únicamente para envases destinados a uso no profesional).

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

En la etiqueta de este producto se deberá de incluir la leyenda “autorizado para uso no profesional”, en caracteres preferentemente visibles.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.