SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 18939 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 17/01/1992 **Renovación:** 05/04/2019 **Caducidad:** 31/08/2026

Nombre Comercial: FOCUS ULTRA

Titular

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF SE

Carl-Bosch Str. 38

D-67056 Ludwigshafen

(Rhein)

ALEMANIA

Composición

CICLOXIDIM 10% [EC] P/V

Envases

- Envases de COEX PA/PE de tamaños: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l y 10 l.
- Envases de HDPE-fluorado (HDPE/F) de tamaños: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l y 10 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Adormidera	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	2 - 5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde 2 hojas desplegadas hasta 9 o más brotes laterales visibles (BBCH 12-29). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ajo	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Albaricoquero	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Algodonero	Gramíneas anuales Gramíneas plurianuales	2 - 5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Exclusivamente para uso en la industria textil. Aplicar desde 2 hojas desplegadas hasta 9 o más brotes laterales visibles (BBCH 12-29). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Arroz	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Oryza sp. Aplicar en presiembra del cultivo y en post-emergencia de las malas hierbas.
	Gramíneas plurianuales	4 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Aplicar en presiembra del cultivo y post-emergencia de las malas hierbas.

Berenjena	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
Berza , col	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Cebolla	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Cebolleta	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Chalote	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
Col de Bruselas	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Col de China	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado de cada variedad (BBCH 13-35).
Coliflor	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Colza	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay tres hojas desplegadas hasta 9 o más nudos perceptibles (BBCH 13-35)
Escarola	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Espinaca	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que 9 hojas verdaderas están desplegadas (BBCH13-19)
Garbanzo	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBCH 13-35)
Girasol	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que el primer par de hojas están desplegadas hasta 8 hojas desplegadas (BBCH 12-18)
	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).

Guisante para grano	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Guisante verde	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en guisantes verdes sin vaina. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en guisantes verdes sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Haba para grano	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la tercera hoja verdadera está desplegada hasta 9 o más nudos alargados visiblemente (BBHC 13-35)
Haba verde	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en habas verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en habas verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Judía para grano	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que se observen 2 hojas (con estípulas), desplegadas, o 2o zarcillo, desarrollado (en las variedades sin hojas) hasta 9 o más entrenudos, alargados visiblemente (BBCH12-39).
Judía verde	Gramíneas anuales	2 l/ha				Uso en judías verdes con y sin vaina. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso en judías verdes con y sin vaina contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde 2 hojas enteras (1er. par de hojas), desplegadas hasta 9 o más brotes laterales, visibles (BBCH12-39).
Lechuga	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 3a hoja verdadera está desplegada hasta que la roseta está completamente desarrollada (BBCH 13-39)
Manzano	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Melocotonero	Gramíneas anuales	2 l/ha				Incluye nectarino. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Incluye nectarino. Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Membrillero	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Patata	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que las primeras hojas comienzan a alargarse hasta que 9 hojas del tallo principal estén desplegadas (BBCH 10-19)
Peral	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que los frutos alcanzan el 60% del tamaño varietal final (BBCH 76).
Pimiento	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical primario este visible (BBCH12-23).
Puerro	Gramíneas anuales	2 l/ha				Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la 5a hoja (>3cm) es claramente visible hasta que el bulbo o fuste ha alcanzado el 50% de su diámetro final (BBCH 15-45)

Remolacha azucarera	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
Remolacha forrajera	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que tres hojas están desplegadas hasta que la cobertura del cultivo ha finalizado: cerca del 90% de las plantas se tocan entre las hileras (BBCH 13-39)
Repollo	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que la quinta hoja está desplegada hasta que la roseta foliar alcanza el 50% del diámetro típico esperado (BBCH 15-35)
Salsifí	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
Soja	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde que hay una hoja trifoliar desplegada en el cuarto nudo hasta que haya una en el noveno nudo (BBCH 14-19)
Tomate	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 2ª hoja verdadera desplegada hasta que 3er brote apical lateral primario este visible (BBCH12-23).
Verdolaga	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13 -19).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta 9 hojas verdaderas o más desplegadas (BBCH 13-19).
Vid	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar hasta que todas las bayas del racimo se tocan (BBCH 79).
Zanahoria	Gramíneas anuales	2 l/ha	1	-	150-400 l/ha	Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).
	Gramíneas plurianuales	5 l/ha				Uso contra Agropyrum sp, Sorghum sp. y Cynodon sp. Para pulverizaciones con lanza/pistola, dosis: 4,85 l/ha. Aplicar desde la 3ª hoja verdadera desplegada hasta que se alcanza el 50% del diámetro esperado para la raíz (BBCH 13-45).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Escarola, Lechuga, Pimiento	21
Albaricoquero, Cebolla, Coliflor, Espinaca, Haba verde, Judía verde, Manzano, Melocotonero, Membrillero, Peral, Repollo, Verdolaga	28
Guisante verde, Salsifí, Zanahoria	35
Ajo, Berenjena, Berza , col, Cebolleta, Chalote, Col de Bruselas, Col de China, Puerro, Tomate, Vid	42
Garbanzo, Guisante para grano, Haba para grano, Judía para grano, Patata, Soja	56
Adormidera, Algodonero, Arroz, Colza, Girasol, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera	NP

Condiciones Generales de Uso

Herbicida de acción sistémica para el control de gramíneas anuales y plurianuales.Para uso profesional, en cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.Tratar al atardecer ya que la luz descompone el producto, así como en terreno en tempero, siendo la temperatura óptima de 15-25 º C para una mayor eficacia.Existe riesgo de desarrollo de resistencias. Para reducir el riesgo de aparición de resistencias, se recomienda:- Aplicación del producto siguiendo las indicaciones que figuran en la etiqueta.- Mezclar o secuenciar herbicidas con diferentes modos de acción.- Realizar métodos culturales, siempre que sea posible, para el manejo de malas hierbas.

Clase de Usuario

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.
No se debe autorizar para el uso en jardinería exterior doméstica, ni para uso profesional en lugares destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Para pulverizaciones manuales con mochila o lanza/pistola y pulverizaciones con tractor:

o ropa de trabajo
o guantes de protección química

• APLICACIÓN:

Mediante tractor: ropa de trabajo.
Mediante lanza/pistola y mochila: ropa de trabajo y guantes de protección química.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo: soja, patata, judías para grano, habas para grano, guisantes para grano, colza, girasol, remolacha azucarera, remolacha forrajera
o Ropa de trabajo y guantes de protección química: vid, cebolleta, puerro, tomate, coles de bruselas, col china, berza, berenjena, garbanzo, zanahoria, guisante verde sin vaina, lechuga, escarola, pimiento, espinacas, verdolaga, cebolla, chalota, salsifí, ajo, judías verdes, habas verdes, repollo, coliflor, manzano, peral, membrillo, melocotonero (nectarino), albaricoque (Los guantes de protección química están destinados a labores de reentrada relacionadas con el uso del herbicida para las malas hierbas tratadas)

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación) GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H315 -Provoca irritación cutánea. H319 -Provoca irritación ocular grave. H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H361d -Se sospecha que daña al feto.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P301+P330+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta deberá indicarse que contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5). La Nafta disolvente del petróleo con nºCAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No autorizado para jardinería exterior doméstica, ni en lugares destinados al público en general (aplicaciones profesionales).

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de; Algodonero y adormidera, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”