

Datos del Producto

Número de Registro: 17502 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 25/02/1988 **Renovación:** 14/12/2018 **Caducidad:** 31/05/2027

Nombre Comercial: LEBRON

Titular

ADAMA Agriculture España S.A.

C/ Ramírez de Arellano N.º 29-2ª

28043 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Fabricante

ADAMA CELSIUS B.V. CURAÇÃO BRANCH

Pos Cabai Office Park, Unit 13 - P.O. Box 403

CURAAO

ANTILLAS HOLANDESAS

Composición

TEFLUTRIN 0,5% [GR] P/P

Envases

Envases de HDPE con rango de capacidad menor o igual que 15 kg.

- Sacos de polietileno (PE) con rango de capacidad menor o igual que 15 kg.
- Sacos de papel / tereftalato de polietileno metalizado (PETP met.) / polietileno (PE) con rango de capacidad menor o igual que 15 kg.
- Sacos de papel / tereftalato de polietileno (PETP) / aluminio (Al) / polietileno (PE) con rango de capacidad menor o igual que 15 kg.
- Sacos de papel / polietileno (PE) / aluminio (Al) / polietileno (PE) con rango de capacidad menor o igual que 15 kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Algodonero	Elatéridos, Elateridae	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Algodonero	Elatéridos, Elateridae	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.					
	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.					
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Algodonero	Miriápodos	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua					

Apio	Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis Típulas, Tipulidae	15 - 20 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15-20 kg/ha.
Berenjena	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Miriápodos Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae Mosca de los sembrados, Delia platura Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis Típulas, Tipulidae	15 - 20 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15-20 kg/ha.
Camelina	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Cártamo	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Colinabo	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp. Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Miriápodos Mosca de la cebolla, Delia antiqua Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis Típulas, Tipulidae	15 - 20 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15-20 kg/ha.
Colza	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Elatéridos, Elateridae					

Girasol	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
Guisante verde	Elatéridos, Elateridae					
	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.					
Haba verde	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae					
Hinojo	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.					
	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.					
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Miriápodos					
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua					
	Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae					
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis					
	Típulas, Tipulidae	15 - 20 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15-20 kg/ha.
	Hortalizas del género Brassica	Elatéridos, Elateridae				
Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.						
Judía verde	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae					
	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.					
	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.					
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Miriápodos					
	Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae					
	Mosca de los sembrados, Delia platura					
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis					

Lechuga y similares	Típulas, Tipulidae	15 - 20 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15-20 kg/ha.
Maíz	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	También maíz dulce. Aplicación antes o durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae					
Melón	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra a dosis 15 kg/ha.
	Elatéridos, Elateridae					
	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.					
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Miriápodos					
	Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae					
	Mosca de los sembrados, Delia platura					
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis					
	Típulas, Tipulidae					
Mostaza, mostaza blanca	Elatéridos, Elateridae	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Escarabajo sanjuanero, Melolontha spp.					
Nabo	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae					
Rábano	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae					
Remolacha azucarera	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis					
	Maripaca de la remolacha, Aubeonimus mariaefranciscae					
Sandía	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.	15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra, a dosis 15 kg/ha.
	Miriápodos					
	Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae					
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis					
	Típulas, Tipulidae					
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
	Mosca de los sembrados, Delia platura					
	Elatéridos, Elateridae					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Elatéridos, Elateridae					

Sésamo, ajonjolí	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp.	10 - 15 Kg/ha				(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicación antes o durante la siembra. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Soja	Elatéridos, Elateridae Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Mosca de los sembrados, Delia platura Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis	12 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación durante la siembra a dosis 12-15 kg/ha.
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera Elatéridos, Elateridae Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Mosca de los sembrados, Delia platura Típulas, Tipulidae					Aplicación durante la siembra a dosis 12-15 kg/ha.
Sorgo	Miriápodos	12 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Exclusivamente contra Scutigerella immaculata. Aplicación durante la siembra a dosis 12-15 kg/ha.
Tabaco	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
	Elatéridos, Elateridae Escarabajo sanjuanero , Melolontha spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.
Zanahoria	Elatéridos, Elateridae Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae	10 - 15 Kg/ha	1	NA	NP	Aplicación antes o durante la siembra.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Algodonero, Apio, Berenjena, Camelina, Cártamo, Colinabo, Colza, Girasol, Guisante verde, Haba verde, Hinojo, Hortalizas del género Brassica, Judía verde, Lechuga y similares, Maíz, Melón, Mostaza, mostaza blanca, Nabo, Rábano, Remolacha azucarera, Sandía, Sésamo, ajonjolí, Soja, Sorgo, Tabaco, Tomate, Zanahoria	NP

Condiciones Generales de Uso



Insecticida de contacto para uso profesional, en cultivos al aire libre mediante incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador. Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo. No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas.

Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009).
- o Calzado resistente a productos químicos.
- o Guantes de protección química.
- o Mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P1 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC: 2002, UNE-EN 143:2001/AC: 2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

• APLICACIÓN

- Mediante tractor con equipo dispensador

Todos los usos autorizados:


- o Ropa de trabajo.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



Spe3:

- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
 - 10 m con cubierta vegetal para hortalizas del género Brassica (brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col, col china), lechuga y similares, berenjena, tomate, sandía, melón;
 - 10 m con cubierta vegetal o 20 m sin cubierta para zanahoria, rábano, nabo, colinabo, hinojo, apio;
 - 10 m para judía verde, haba verde, remolacha azucarera, girasol, cártamo, colza, mostaza, mostaza blanca, camelina, sésamo, ajonjolí, tabaco, soja;
 - 5 m para maíz, maíz dulce, sorgo, algodón, guisante verde.

- Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de:
 - 5 m para todos los cultivos (para proteger a las abejas)

Spe5:

- Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo.

Spe6:

- Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, recójase todo derrame accidental.

Spe8:

- Para proteger a las abejas, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, retírense las colmenas durante el tratamiento, no aplicar cuando las malas hierbas estén en floración o elimínense las malas hierbas antes de su floración, no aplicar durante los 10 días previos a la floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: "Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor."

Otras Indicaciones reglamentarias



SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; cártamo, soja, colza, mostaza\mostaza blanca, camelina, sésamo\ajonjolí, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."