

Datos del Producto

Número de Registro: 25558 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 27/06/2016 **Renovación:** **Caducidad:** 31/08/2026
Nombre Comercial: AXIENDO

Titular

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
 C/ Ribera del Loira 8-10, 3ª planta
 28042 Madrid
 (Madrid)
 ESPAÑA

Fabricante

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
 Rosentalstrasse 67
 4058
 (Basilea)
 SUIZA

Composición

LAMBDA CIHALOTRIN 0,0015% [ME] P/V

Envases

Envases PET ó HDPE de 750 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Achicoria (hojas)	Áfidos, pulgones, Aphididae	20 - 50 ml/m2	Exclusivamente contra Myzus persicae. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
Alcachofa	Áfidos, pulgones, Aphididae	50 ml/m2	Exclusivamente contra Aphis fabae, Brachycaudus cardui, Brachycaudus helichrysi, Capitophorus horni y Myzus ornatos. Pulverización manual foliar: 1 aplicación/campaña.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente contra Trialeurodes vaporariorum. Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Trips	30 - 100 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
Berenjena	Áfidos, pulgones, Aphididae	50 - 66,7 ml/m2	Exclusivamente contra Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Mariposas de la col, Pieris spp.		Exclusivamente contra Pieris brassicae. Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.

Brécol	Polilla de las crucíferas, <i>Plutella xylostella</i>	50 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
	Lepidópteros		Exclusivamente contra <i>Mamestra oleracea</i> . Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Calabacín	Piral del maíz, <i>O.nubilalis</i>	50 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Calabaza	Piral del maíz, <i>O.nubilalis</i>	50 - 66,67 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Mariposas de la col, <i>Pieris spp.</i>		Exclusivamente contra <i>Pieris brassicae</i> . Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
Col de Bruselas	Polilla de las crucíferas, <i>Plutella xylostella</i>	50 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
	Mariposas de la col, <i>Pieris spp.</i>		Exclusivamente contra <i>Pieris brassicae</i> . Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
Coliflor	Polilla de las crucíferas, <i>Plutella xylostella</i>	50 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Coníferas	Trips	30 - 100 ml/m ²	Exclusivamente para usos ornamentales. Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
Frambueso	Áfidos, pulgones, Aphididae	50 ml/m ²	Exclusivamente contra <i>Amphorophora rubi</i> y <i>Aphis idae</i> . Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
	Lepidópteros	50 ml/m ²	Exclusivamente contra <i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i> y <i>Euxoa nigricans</i> . Aplicación manual foliar. Máximo 2 aplicaciones/campaña con un intervalo de 14-21 días.
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae	66,7 ml/m ²	Exclusivamente contra <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> . Pulverización foliar manual. Realizar 2 aplicaciones/campaña, intervalo de 14-21 días.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente para usos ornamentales. Exclusivamente contra <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Fronosas	Trips	30 - 100 ml/m ²	Exclusivamente para usos ornamentales. Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
Grosellero	Áfidos, pulgones, Aphididae	50 ml/m ²	Exclusivamente contra <i>Aphis schneideri</i> . Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
Guisante verde	Pulgón del guisante, <i>Acyrtosiphon pisum</i>	41,67 - 50 ml/m ²	(con vaina y sin vaina) Pulverización manual foliar. Realizar dos aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		Pulverización manual foliar. 1 aplicación/campaña.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Lepidópteros	66,67 - 83,33 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
Judía verde	Pulgón del guisante, <i>Acyrtosiphon pisum</i>	41,67 - 50 ml/m ²	(con vaina y sin vaina) Pulverización manual foliar. Realizar dos aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae	50 ml/m ²	Exclusivamente contra <i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribis-nigri</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> e <i>Hyperomyzus euphorbiae</i> . Pulverización manual foliar, 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Melón	Piral del maíz, <i>O.nubilalis</i>	50 - 66,67 ml/m ²	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.

	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente contra Trialeurodes vaporariorum. Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Ornamentales herbáceas	Trips	30 - 100 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente contra Trialeurodes vaporariorum. Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Palmáceas	Trips	30 - 100 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
	Curculiónidos, Curculionidae		Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Exclusivamente contra curculiónidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Escolítidos, Scolytidae		Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Exclusivamente contra escolítidos barrenadores de la madera. Realizar una única aplicación/campaña.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Exclusivamente contra Trialeurodes vaporariorum. Realizar una única aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Noctuidos, Noctuidae		
Palmera datilera	Trips	30 - 100 ml/m2	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Pulverización manual foliar. Realizar 1 aplicación/campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		Exclusivamente contra Aphis fabae, Aphis frangulae, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. Pulverización manual foliar, dos aplicaciones/campaña e intervalo de 10 días.
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata		
	Polilla de la patata, Phthorimaea operculella	50 - 66,7 ml/m2	Pulverización manual foliar, dos aplicaciones/campaña e intervalo de 10 días.
Patata			
Pepinillo	Lepidópteros	50 ml/m2	Exclusivamente contra Mamestra oleracea. Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		Exclusivamente contra Aphis sp. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Pepino	Noctuidos, Noctuidae	33,33 - 50 ml/m2	Exclusivamente contra Barathra sp. Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Lepidópteros	50 ml/m2	Exclusivamente contra Agrotis ipsilon, Agrotis segetum y Euxoa nigricans. Pulverización manual foliar, máximo 2 aplicaciones/campaña con un intervalo de 12 días.
Pimiento	Áfidos, pulgones, Aphididae	66,7 ml/m2	Exclusivamente Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. Pulverización manual foliar, realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Rábano	Pulguilla de la col, Phyllotreta spp.	33,33 ml/m2	Exclusivamente contra Phyllotreta aerea. Realizar dos aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis		Pulverización manual foliar. Realizar una única aplicación/campaña.
Remolacha azucarera	Chicharrita de la remolacha, Circulifer tenellus	33,33 - 50 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar una única aplicación/campaña.
	Chicharrita de la remolacha, Circulifer tenellus		
Remolacha de mesa	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis	33,33 - 50 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar una única aplicación/campaña.

Repollo	Mariposas de la col, Pieris spp.	50 ml/m2	Exclusivamente contra Pieris brassicae. Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
	Polilla de las crucíferas, Plutella xylostella		Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 14 días.
Sandía	Piral del maíz, O.nubilalis	50 - 66,67 ml/m2	Pulverización manual foliar. Realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
Tomate	Mosquitos verdes, Empoasca spp.	33,33 - 66,7 ml/m2	Exclusivamente contra Empoasca vitis. Pulverización manual foliar, realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		Exclusivamente contra Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae. Pulverización manual foliar, realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Crisomélidos, Chrysomelidae		Exclusivamente contra Psylliodes affinis. Pulverización manual foliar, realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.
	Lepidópteros		Exclusivamente contra Agrotis ipsilon, Agrotis segetum y Euxoa nigricans. Pulverización manual foliar, realizar 2 aplicaciones/campaña e intervalo de 12 días.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Fresal, Guisante verde, Judía verde, Melón, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Sandía, Tomate	3
Brécol, Col de Bruselas, Coliflor, Frambueso, Grosellero, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Rábano, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Repollo	7
Achicoria (hojas), Alcachofa, Lechuga, Patata	14
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera	NP

Condiciones Generales de Uso



Se trata de un producto "listo al uso" para uso no profesional.
 Producto autorizado al aire libre. En ornamentales (plantas) se autoriza su uso también en invernadero.
 Controla un amplio espectro de insectos chupadores y masticadores.
 Tipo de pulverización: manual foliar. Aplicar al principio de la infestación.
 Este producto puede inducir la proliferación de ácaros, recomendando la vigilancia de los cultivos susceptibles, por si fuera necesario un tratamiento acaricida.

Clase de Usuario



Autorizado para jardinería exterior doméstica.


Mitigación de riesgos en la manipulación



Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P405 -Guardar bajo llave. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias



Autorizado para jardinería exterior doméstica.
 Para los usos en jardinería exterior doméstica, se deberán cumplir las especificaciones recogidas en el RD 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
 Otros componentes además del ingrediente activo técnico: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
 La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.