



|                                                                                                                                                        |                                      |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                                       | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,02 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1000 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,20 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,40 l/ha).                                                  |
| Cucurbitáceas de piel no comestible                                                                                                                    | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,02 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1000 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,20 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,40 l/ha).                                                  |
| Especies vegetales                                                                                                                                     | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,125 %          | 2 | 14 días    | 500 l/ha        | Para uso únicamente en viveros. Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25 l/ha).                           |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                                 | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Tomate                                                                                                                                                 | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,033 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha).                                                  |
| Vid                                                                                                                                                    | Oídio de la vid, Erysiphe necator    | 0,01 - 0,02 %    | 3 | 10-14 días | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,1-0,2 l/ha (dosis máxima total por año: 0,3-0,6 l/ha).                                                      |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor |                                      |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                               | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                                       | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,02 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1000 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,20 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,40 l/ha).                                                  |
| Cucurbitáceas de piel no comestible                                                                                                                    | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,02 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1000 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,20 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,40 l/ha).                                                  |
| Especies vegetales                                                                                                                                     | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,125 %          | 2 | 14 días    | 500 l/ha        | Para uso únicamente en viveros. Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25 l/ha).                           |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                                 | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Tomate                                                                                                                                                 | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,033 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha).                                                  |
| Vid                                                                                                                                                    | Oídio de la vid, Erysiphe necator    | 0,01 - 0,02 %    | 3 | 10-14 días | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,1-0,2 l/ha (dosis máxima total por año: 0,3-0,6 l/ha).                                                      |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola      |                                      |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                               | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Berenjena                                                                                                                                              | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,003 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos.<br>Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha). |
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                                       | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,03 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,30 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,60 l/ha).                                                  |
| Cucurbitáceas de piel no comestible                                                                                                                    | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,03 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,30 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,60 l/ha).                                                  |
| Especies vegetales                                                                                                                                     | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,125 %          | 2 | 14 días    | 500 l/ha        | Para uso únicamente en viveros. Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25 l/ha).                           |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                                 | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Pimiento                                                                                                                                               | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,003 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha).                                                  |
| Tomate                                                                                                                                                 | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,033 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha).                                                  |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila              |                                      |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                               | Oídios, Erysiphaceae                 | 0,0125 - 0,033 % | 2 | 14 días    | 500 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,125-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,25-0,66 l/ha).                                                 |
| Berenjena                                                                                                                                              | Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica | 0,002 - 0,003 %  | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos.<br>Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,02-0,33 l/ha (dosis máxima total por año: 0,04-0,66 l/ha). |
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                                       | Oídio, Golovinomyces cichoracearum   |                  |   |            |                 |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                        | Oídio, Podosphaera fuliginea         | 0,004 - 0,03 %   | 2 | 14 días    | 200 - 1500 l/ha | Aplicar por pulverización sin superar una dosis máxima total por aplicación de 0,04-0,30 l/ha (dosis máxima total por año: 0,08-0,60 l/ha).                                                  |



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará en mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3 o tipo delantal tipo PB 3 o PB 4.
- Calzado de protección frente a productos químico.

El aplicador utilizará en la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o tipo 6.
- Calzado de protección frente a productos químicos.

El aplicador utilizará en mezcla/carga y aplicación en ornamentales en invernadero:

- Guantes de protección química
- Ropa de protección tipo 4
- Calzado de protección frente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada: ropa de protección C1 o ropa de trabajo y calzado cerrado, además de guantes de protección química durante la reentrada en vid y ornamentales (ver medidas adicionales).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evite el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- El trabajador debe usar guantes de protección química en vid, durante 7 días tras la tercera aplicación, no siendo necesario después de la primera y segunda aplicación; y en ornamentales (aire libre e invernadero), durante todo el manejo del cultivo tratado tras la segunda y tercera aplicación.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          |                                                                                                                                                                                      |
| Pictograma                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Palabra de Advertencia                         |                                                                                                                                                                                      |
| Indicaciones de Peligro                        |                                                                                                                                                                                      |
| Consejos de Prudencia                          | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.                                         |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 1                                                                                                                                                                   |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                           |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                             |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                               |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales

Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Spe 8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Elimínense las malas hierbas antes de su floración.

Para proteger la cría de abejas, no aplicar más de 330 g sustancia activa/ha y año.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:

Otras leyendas e indicaciones:

EUH 208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

