

Coliflor	Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica	1,15 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al aire libre mediante pulverización, empleando un volumen de caldo de 400-1500 l/ha, en un máximo de 2 aplicaciones (BBCH 13-51), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Lechuga	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	1,5 l/ha	Aire libre e invernadero, mediante pulverización: volumen de caldo: 400-1500 l/ha. Para usos al aire libre, un máximo de 2 aplicaciones por campaña separadas entre sí 10 días. Para usos en invernadero, una única aplicación.
Locales y almacenes	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	5 - 10 ml/m2	Exclusivamente para suelos de instalaciones de semilleros de hortícolas. Humectación del suelo (mezcla en tanque y aplicación por difusión) de forma preventiva antes de la siembra. 1-2 aplicaciones con un intervalo de 7-10 días. Enjuagar las hojas mojadas con agua.
Melón	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	
	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	3 l/ha	Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aire libre: En pulverización foliar empezar las aplicaciones cuando se observe el primer síntoma de ataque, con un máximo de 3 aplicaciones y un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 300-1500 l/ha.
Pepino	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	
	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	3 l/ha	Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aire libre: En pulverización foliar empezar las aplicaciones cuando se observe el primer síntoma de ataque, con un máximo de 3 aplicaciones y un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 300-1500 l/ha.
Pimiento	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha.
Repollo	Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica	1,15 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar al aire libre mediante pulverización, empleando un volumen de caldo de 400-1500 l/ha, en un máximo de 2 aplicaciones (BBCH 13-49), con un intervalo de 10 días entre las mismas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Sandía	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	
	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	3 l/ha	Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Aire libre: En pulverización foliar empezar las aplicaciones cuando se observe el primer síntoma de ataque, con un máximo de 3 aplicaciones y un intervalo de 10 días entre aplicaciones. Volumen de caldo: 300-1500 l/ha.
Tabaco	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Tomate	Phytophthora spp.		
	Pythium spp.	2 l/ha	Aire libre e invernadero: Aplicación preventiva por riego por goteo en el momento del trasplante o en cualquier otro momento con alto riesgo de infección. Máximo 4 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 7-15 días. Volumen de caldo: 500-1500 l/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Melón, Pepino, Pimiento, Sandía, Tabaco, Tomate	3
Brécol, Coliflor, Repollo	14
Lechuga	14 días invernadero; 7 días aire libre
Col de Bruselas, Locales y almacenes	NP



Condiciones Generales de Uso

Para suelos de semilleros y semilleros, aplicar 3-6 L de una solución al 0,15% por m2. Humectación del suelo de forma preventiva antes de la siembra. Repetir al cabo de 1-2 semanas según presión del hongo. Mojar bien el suelo/sustrato con la solución. Enjuagar las hojas mojadas con agua.

En tomate, pepino y berenjena, aplicación al aire libre o invernadero, tanto en suelo natural como en sustrato.

En cucurbitáceas, en aplicación por riego por goteo, puede ser aplicación al aire libre o invernadero, tanto en suelo natural como en sustrato.



Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:
Se utilizará guantes de protección química en operador en mezcla/carga y/o aplicación como mínima medida de protección individual.
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación, o en su defecto que la mezcla/carga.
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.
No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.
En cucurbitáceas, en pulverización se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección química (se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) y calzado adecuado.
En lechuga en campo, brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo, en pulverización con tractor se utilizarán guantes de protección química. En lechuga en campo, brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo, en pulverización manual se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección química (se corresponde con un equipo de tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) y calzado adecuado. En lechuga en invernadero, en pulverización manual se utilizarán guantes de protección química se utilizarán guantes de protección química y ropa de protección química tipo 6 (se corresponde con un equipo de tipo 6 de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A 1: 2009).

Seguridad del trabajador:
En cucurbitáceas, en pulverización, para tareas de más de 2 horas se utilizarán guantes de protección química.
El operador no manipulará la instalación del sistema de riego o de humectación del suelo durante la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de riego o de humectación del suelo antes del comienzo de la aplicación del producto.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.



