

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-00507		COMPO BIO INSECTICIDA STOP		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Cucurbitáceas	Araña roja común, Tetranychus spp.	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos en interiores, invernadero y aire libre en calabacín, calabaza, pepino, melón, sandía y melón cantalupo contra Tetranychus urticae.Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Endibia	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
Endrino	Pulgón verde del ciruelo, Brachycaudus helichrysi	225 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre contra Brachycaudus helichrysi. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85. Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.					
Espinacas y similares	Áfidos, pulgones, Aphididae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en acelgas y espinacas contra Nasonovia ribisnigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
	Araña roja común, Tetranychus spp.					Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en espinaca y acelga contra Tetranychus urticae. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
Frutales de hueso	Moscas blancas, Aleyrodidae	225 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en espinacas y acelgas contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
	Pulgón verde, Myzus persicae					Tratamientos al aire libre en albaricoquero, ciruelo, endrino, melocotonero y nectarino contra Myzus persicae. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
Frutales de pepita	Araña roja común, Tetranychus spp.	225 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Tratamientos al aire libre en albaricoquero, ciruelo, endrino, melocotonero y nectarino contra Tetranychus urticae. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85.					
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus					En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.					
	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi					Tratamientos al aire libre en manzano, peral y membrillo contra Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Granado	Araña roja común, Tetranychus spp.	225 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre en manzano, peral y membrillo contra Tetranychus urticae. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					Tratamientos al aire libre en manzano, peral y membrillo. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Haba forrajera	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre.Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Haba para grano	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Haba verde	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre, interiores e invernaderos frente a Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporarium. Uso en menta verde, orégano, mejorana, perejil, apio, eneldo, hinojo, cilantro, romero y lavanda. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Araña roja común, Tetranychus spp.					Tratamientos en interiores e invernadero frente a Tetranychus urticae. Uso en menta verde, orégano, mejorana, perejil, apio, eneldo, hinojo, cilantro, romero y lavanda.Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Tratamientos en invernaderos e interiores frente a Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae. Uso en menta verde, orégano, mejorana, perejil, apio, eneldo, hinojo, cilantro, romero y lavanda. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Hortalizas del género Brassica	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos aire libre en coles, coles de Bruselas, repollo, coliflor, brecol contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Araña roja común, Tetranychus spp.					Tratamientos aire libre en coles, coles de Bruselas, repollo, coliflor, brecol contra Tetranychus urticae.Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Judía forrajera	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre en coles, coles de Bruselas, repollo, coliflor, brecol contra Brevicoryne brassicae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Judía para grano	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Judía verde	Pulgón negro de las habas, Aphis fabae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos al aire libre. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
Lechuga y similares	Moscas blancas, Aleyrodidae	200 ml/m2	Máx. 3	7-10	NP	Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en lechuga, escarola y canónigos contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en lechuga, escarola y canónigos contra Nasonovia ribisnigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii. Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					
	Araña roja común, Tetranychus spp.					Tratamientos en interiores, invernaderos y al aire libre en lechuga, escarola y canónigos contra Tetranychus urticae.Aplicar en el estadio de cultivo BBCH 10-85					



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-00507

COMPO BIO INSECTICIDA STOP

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Condiciones Generales de Uso

Tratamientos insecticida/acaricida para uso no profesional al aire libre, en invernadero y en interiores (según condicionamiento):- Para plantas de menos de 50 cm de altura, aplicar una dosis de 1000 l/ha. Considerando el máximo permitido de 10 L de producto al día, equivale a un jardín de 100 m2 de extensión.- Para plantas entre 50 y 125 cm de altura, aplicar una dosis de 1500 l/ha. Considerando el máximo permitido de 10 L de producto al día, equivale a un jardín de 67 m2 de extensión.- Para plantas de más de 125 cm de altura, aplicar una dosis de 2000 l/ha. Considerando el máximo permitido de 10 L de producto al día, equivale a un jardín de 50 m2 de extensión.Aplicar un máximo de 600 ml/m2 y año.Aplicación en frutales: Por cada metro de altura a la copa, hasta 3 m, aplicar una dosis de 750 l/ha. Considerando el máximo permitido de 10 L de producto al día, equivale a un jardín de:-134m² de extensión para plantas de 1 m de altura.- 67m² de extensión para plantas de 2 m de altura.- 45m² de extensión para plantas de 3 m de altura.Aplicar un máximo de 675 ml/m2 y año.Los tratamientos se realizaran al comienzo de la aparición de la plaga de marzo a octubre al aire libre y durante todo el año en invernaderos e interiores.

Clase de Usuario

Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Se recomienda utilizar guantes de protección química durante el manejo del producto.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/los vapores/aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Eliminación del producto y/o caldo

Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para uso domestico y jardineria exterior doméstica.
En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda: “autorizado para uso doméstico y jardinería exterior doméstica”, en caracteres preferentemente visibles.
Se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios.
EUH 408: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH 401:A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Página 4 de 4

113879 - 2026184