



Condiciones Generales de Uso

Fungicida en post-recolección.

Aplicación: Agitar el bote, desprender la etiqueta de la tapa superior e introducir la mecha a fondo en el orificio. Colocar el bote sobre un soporte aislante. Prender la mecha y cerrar inmediatamente el recinto (mantenerlo cerrado al menos 8 horas tras la aplicación).

Una vez abierto, se dejará airear el local al menos 1 hora antes de entrar en el mismo.

En la etiqueta se deberá indicar que cuando así lo exija la legislación vigente, en el país de destino de los frutos tratados, los embalajes que contienen los productos tratados deberán contener el texto "Frutos tratados con protección fungicida de imazalil".

Cuando se formule para tratamientos de frutos destinados a la exportación, incluyendo alguna otra cera o resina, distintas de las especificadas por exigirlo la legislación vigente en el país importador, se etiquetará con el texto siguiente: "Este producto no cumple los requisitos establecidos para el tratamiento de frutos cítricos destinados al mercado español y del resto de países de la Unión Europea".

Uso reservado a centrales hortofrutícolas y aplicadores profesionales.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

INTERIOR

• Aplicación

o Guantes de protección química

o Ropa de trabajo

o Gafas de protección o pantalla facial (UNE-EN 166:2002.)

• Limpieza y mantenimiento de la cámara.

o Guantes de protección química.

o Ropa de trabajo

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Guantes de protección química.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

La aplicación se realizará en cámaras de conservación en centrales hortofrutícolas que presenten cierre hermético. Asimismo el equipo deberá presentar un sistema de autolimpieza.

Spo3: Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

Spo5: Ventilar las zonas tratadas bien antes de volver a entrar.



Página 2 de 4

114172 - 2026210



