



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

24583

COTTONEX NEOPRO

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 24583

Estado: ☒ Vigente

Fechas

Inscripción: 14/02/2008

Renovación: 15/07/2019

Caducidad: 31/05/2027

Nombre Comercial:

COTTONEX NEOPRO

Titular

ADAMA Agriculture España S.A.

C/ Ramírez de Arellano N.º 29-2ª

28043 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Fabricante

ADAMA Agriculture España S.A.

C/ Ramírez de Arellano N.º 29-2ª

28043 Madrid

(Madrid)

ESPAÑA

Composición

FLUOMETURON 25% + TERBUTILAZINA 20,8% [SC] P/V

Envases

Botellas de 1l y garrafas de 5, 10 y 20 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Algodonero	Malas hierbas	4 l/ha	1	-	250-400 l/ha.	Aplicar en pulverización dirigida al suelo a baja presión. Aplicar el producto a todo terreno, en presembrado o preemergencia poco después de sembrar (1-5 días) (BBCH 00-09). No emplear en pre-emergencia cuando se vaya a utilizar acolchado de plástico en el cultivo.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Algodonero	NP

Condiciones Generales de Uso

El uso se limitará a una aplicación cada tres años en el mismo campo. Herbicida de preemergencia del cultivo contra malas hierbas anuales y vivaces de hoja ancha y gramíneas. Para uso profesional, en cultivo de algodón al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización con tractor. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. Observaciones: Evitar que la deriva de la pulverización pueda alcanzar los cultivos colindantes. Se recomienda un plazo de seguridad de más de 12 meses para cultivar remolacha o espinaca. Es conveniente una lluvia o riego después de la aplicación (20-30 mm) para activar el herbicida. No utilizar en suelos muy arenosos, pedregosos, pobres en materia orgánica o con problemas nutricionales graves que limiten el cultivo. Lluvias intensas o riegos muy copiosos posteriores a la aplicación pueden causar daños en el cultivo o restar efectividad al tratamiento.

Página 1 de 4

114254 - 2026194

Clase de Usuario
Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación
SEGURIDAD DEL APLICADOR AIRE LIBRE: • MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO: Pulverizaciones con tractor: o Ropa de trabajo. o Guantes de protección química. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR o Ropa de trabajo y calzado adecuado (Norma UNE-EN ISO 20347:2013) FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Se utilizarán boquillas que supongan una reducción del 50% de la deriva. Se respetará una banda de seguridad de 10 m a zonas residenciales. Se restringirá el acceso a toda persona ajena al tratamiento durante la aplicación del producto con una banda de seguridad de 10 metros.



Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta deberá indicarse que contiene Etilenglicol (CAS 107-21-1).
El preparado no se usará en combinación con otros productos.
Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Debido al potencial riesgo de los metabolitos de ambas sustancias activas para las aguas subterráneas, se considera necesario un control de los datos de monitoreo de este producto en las aguas subterráneas para los usos autorizados.