

				24643 ABANTO			SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Ciruelo	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Aplicar únicamente en prefloración.		
Coníferas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Endrino	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Aplicar únicamente en prefloración.		
Espinacas y similares	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,6 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	650-800 l/ha	Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Trips							
Fresal	Trips	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
Frondosas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Lechuga y similares	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,6 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	650-800 l/ha	Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Trips							
Melocotonero	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Al aire libre. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Palmáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Trips							
Palmera datilera	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Pepino	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	En invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
Pimiento	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	En invernadero. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,75 l/ha	Máx. 2	Mín. 7	800-1000 l/ha	Al aire libre. Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo, cuando se desarrolle la plaga.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae							
	Áfidos, pulgones, Aphididae							

o capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

Pulverizaciones manuales con mochila:
o ropa de trabajo,
o guantes de protección química,
o mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro del tipo P2 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Pulverizaciones manuales con carretilla:
o ropa de trabajo,
o guantes de protección química

• APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

Pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila:
o ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009),
o calzado resistente a productos químicos,
o guantes de protección química,
o capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

Pulverizaciones manuales con carretilla
o ropa de trabajo,
o guantes de protección química

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). En el caso de melocotonero (incluye nectarino), se respetará además el plazo de reentrada fijado.
o En lechuga y similares: ropa de trabajo.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

2 días en melocotonero(incluye nectarino), albaricoquero, ciruelo, endrino y cerezo.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
Carretilla de pulverización de productos fitosanitarios, con avance en sentido contrario a la nube de pulverización, provista de dos barras pulverizadoras verticales, cada una de ellas dotada de 4 boquillas de abanico plano con porta-boquillas con función antigoteo. También debe disponer de un manómetro para controlar la presión de trabajo que se recomienda situar entre los 10-15 bares. La distancia entre las barras y el asa debe ser de al menos 1.5 m. Los equipos de pulverización deberán cumplir la legislación que le sea de aplicación en lo relativo a su diseño, comercialización y puesta en servicio, así como encontrarse en correctas condiciones de uso de acuerdo a lo especificado por el fabricante
Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

