

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
				DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Ajo	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua				
	Mosca de los sembrados, Delia platura				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
Albaricoquero	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana				
	Capua, Adoxophyes orana				
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum				
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.	0,06 - 0,09 %			
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella				
	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,06 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	0,07 - 0,09 %			
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus			Contra las larvas en tratamientos de verano.	
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Cuca de la alfalfa, Colaspidema atrum				
	Langostas, saltamontes, Acrididae				
	Lepidópteros	0,6 - 0,8 l/ha			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella				
Algodonero	Heliothis, Helicoverpa spp.				
	Trips	0,6 l/ha		Únicamente autorizado para uso textil.	

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
				DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Almendro	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana				
	Capua, Adoxophyes orana				
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella				
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum				
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.				
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,06 - 0,087 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
Apio	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	0,07 - 0,087 %			
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus			Contra las larvas en tratamientos de verano.	
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,087 %			
	Trips	0,06 - 0,07 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Lepidópteros				
	Mosca del apio, Euleia heraclei				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.				
	Heliothis, Helicoverpa spp.				
	Lepidópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Trips	0,08 - 0,09 %		Campo, invernadero y viveros.	
		Trips	0,06 - 0,07 %		
		Áfidos, pulgones, Aphididae			

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Barbarea	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Berenjena	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata						
	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Berro, mastuerzo	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
		Mariposas de la col, Pieris spp.					
Trips		0,06 - 0,07 %					
Áfidos, pulgones, Aphididae							
Chinches, heterópteros							
Cochinillas, Coccidae							

Brécol	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de la col, Delia radicum		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Trips	0,06 - 0,07 %	Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga.
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga. Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga.
	Trips	0,06 - 0,07 %	
Calabacín	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
		METEOR		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Calabaza	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Mosca de los sembrados, Delia platura				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
Canónigo	Trips	0,06 - 0,07 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Cebada	Áfidos, pulgones, Aphididae			
Gusanos del alambre, Agriotes spp.					
Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Lepidópteros					
Trips		0,6 - 0,8 l/ha			
Cebolla	Trips	0,06 - 0,07 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua				
	Mosca de los sembrados, Delia platura				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana				
	Capua, Adoxophyes orana				
Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella					

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
						DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Cerezo	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum						
	Gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis						
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.						
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.	0,06 - 0,09 %					
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella						
Chopos y álamos	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,06 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Trips	0,07 - 0,09 %					
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus					Contra las larvas en tratamientos de verano.	
Ciruelo	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella						
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %					
	Crisomela del chopo, Chrysomela populi						
	Galeruca del sauce, Galerucella lineola	0,06 - 0,09 %				En campo	
	Barrenador de los brotes del álamo, Gypsonoma aceriana	0,09 %				En viveros.	
	Gorgojo defoliador del chopo, Cryptorhynchus lapathi	0,15 - 0,2 %				En campo, aplicaciones localizadas al tronco. En viveros, dosis: 0,15%.	
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana						
	Capua, Adoxophyes orana						
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella						
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum						
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.						
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.	0,06 - 0,09 %					
	Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana						
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	0,06 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Trips	0,07 - 0,09 %					
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus					Contra las larvas en tratamientos de verano.	
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella						
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %					
	Mariposas de la col, Pieris spp.						
	Trips	0,06 - 0,07 %					

Col de Bruselas	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de la col, Delia radicum		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
Coliflor	Mariposas de la col, Pieris spp.		
	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de la col, Delia radicum		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
Colleja	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
				DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Colza	Elatéridos, Elateridae				
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.				
	Trips	0,6 - 0,8 l/ha			
Diente de león	Trips	0,06 - 0,07 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana				
Endrino	Capua, Adoxophyes orana				
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum				
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.	0,06 - 0,09 %			
	Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana	0,06 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	0,07 - 0,09 %		Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.	
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus			Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Contra las larvas en tratamientos de verano.	
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %		Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.	
	Trips	0,06 - 0,07 %			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA			
				DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL			
Espárrago	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Mosca del espárrago, Platyparea poeciloptera						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
	Trips	0,06 - 0,07 %	Al aire libre y en invernadero.				
	Moscas blancas, Aleyrodidae			Al aire libre e invernadero.			
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae			Al aire libre y en invernadero.			
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii						
	Mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Guisante para grano	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de los sembrados, Delia platura						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Guisante para grano	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.			
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 25760 METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Guisante proteaginoso /forrajero	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
Guisante verde	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
Haba forrajera	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
Haba verde	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Judía forrajera	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.				
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de los sembrados, Delia platura						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Judía verde	Trips		0,06 - 0,07 %				
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.				
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de los sembrados, Delia platura						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
		Ortópteros	0,08 - 0,09 %				
Maíz	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Amphimallon spp., Anoxia villosa, Peontodon spp. y Rhizotrogus spp.				
	Gusanos del alambre, Agriotes spp.						
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.						
	Lepidópteros						
	Trips		0,6 - 0,8 l/ha				
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana						
Capua, Adoxophyes orana							
Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella							
Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum							
Hoplocampa, Hoplocampa spp.							
Minador punteado, Phyllonorycter spp.		0,06 - 0,09 %					
Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana							

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

25760

METEOR

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Manzano	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	0,06 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Trips	0,07 - 0,09 %	
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus		Contra las larvas en tratamientos de verano.
Melocotonero	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella		
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %	
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana		
	Capua, Adoxophyes orana		
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella		
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum		
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.	0,06 - 0,09 %	
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella		
	Polilla oriental, Grapholita molesta	0,06 %	
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Trips	0,07 - 0,09 %	
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus		Contra las larvas en tratamientos de verano.
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella		
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,09 %	
Melón	Trips	0,06 - 0,07 %	
	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
	Cochinillas, Coccidae		
	Escarabeidos, Scarabaeidae		Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.
	Depressaria spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de los sembrados, Delia platura		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %	
	Trips	0,06 - 0,07 %	

 		25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
						DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Mostaza china	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae					Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Naranja	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
Olivo de almazara	Piojos, Diaspididae	0,087 %					
	Caparreta negra, Saissetia oleae						
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae					Generación antófaga.	
Olivo de almazara	Mosca del olivo, Bactrocera oleae						
	Trips	0,08 - 0,09 %					
Olivo de verdeo	Caparreta negra, Saissetia oleae						
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae					Generación antófaga.	
	Mosca del olivo, Bactrocera oleae						
Olivo de verdeo	Trips	0,08 - 0,09 %					
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.						
	Heliothis, Helicoverpa spp.						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Trips	0,08 - 0,09 %				Incluye especies florales. Campo, invernadero y viveros.	
Ornamentales herbáceas	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata						
	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae					Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.						

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
		METEOR		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Patata	Lepidópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Trips		0,06 - 0,07 %		
	Tefrítidos, Tephritidae			[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.	
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
	Depressaria spp.				
Pepino	Lepidópteros				
	Mosca de los sembrados, Delia platura				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata				
	Trips		0,06 - 0,07 %		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
	Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	
Pimiento	Depressaria spp.				
	Lepidópteros				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %			
	Trips		0,06 - 0,07 %		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Cochinillas, Coccidae				
Escarabeidos, Scarabaeidae			Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.		
Depressaria spp.					
Lepidópteros					

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25760		METEOR		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Puerro	Mosca de la cebolla, Delia antiqua						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
Remolacha azucarera	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Cleonus, Conorhynchus mendicus						
	Lepidópteros						
	Lixus, Lixus spp.						
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis	0,6 - 0,8 l/ha					
Rúcula	Trips	0,06 - 0,07 %					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae				Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.		
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Ortópteros	0,08 - 0,09 %					
	Tabaco	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Polilla de la patata, Phthorimaea operculella							
Polilla del tomate, Tuta absoluta							
Pulguillas, Epitrix spp.							
	Trips	0,6 - 0,8 l/ha					
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata						
	Trips	0,06 - 0,07 %			Al aire libre y en invernadero.		
	Moscas blancas, Aleyrodidae				Al aire libre e invernadero.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				Al aire libre y en invernadero.		
	Chinches, heterópteros						
	Cochinillas, Coccidae						
	Escarabeidos, Scarabaeidae				Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.		
	Depressaria spp.						
	Lepidópteros						
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata						
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii						

Tomate	Mosca oriental de la fruta, Bactrocera dorsalis	Ortópteros	0,08 - 0,09 %
Toronja, pomelo	Áfidos, pulgones, Aphididae Mosca de la fruta, Ceratitis capitata Moscas blancas, Aleyrodidae Piojos, Diaspididae		0,087 %
Trigo	Áfidos, pulgones, Aphididae Gusanos del alambre, Agriotes spp. Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. Lepidópteros Trips		0,6 - 0,8 l/ha
Vid	Áfidos, pulgones, Aphididae Lepidópteros Mosquito verde, Jacobiasca lybica Mosquitos verdes, Empoasca spp. Polilla del racimo, Lobesia botrana Saltahojas de la vid, Scaphoides titanus	Contra Lobesia, Noctua, Taladros, Ostrinia, etc.	0,07 - 0,09 %
Zanahoria	Trips Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Cochinillas, Coccidae Escarabeidos, Scarabaeidae Depressaria spp. Lepidópteros Mosca de la zanahoria, Chamaepsila rosae Moscas blancas, Aleyrodidae	Contra larvas de Melolontha spp., Oxythyrea funesta, Popillia japonica y Tropinota squalida.	0,06 - 0,07 % 0,08 - 0,09 %

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Achicoria (hojas), Albaricoquero, Barbarea, Berenjena, Berro, mastuerzo, Brécol, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Cebada, Coliflor, Colleja, Diente de león, Fresal, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba verde, Judía forrajera, Judía verde, Maíz, Manzano, Melocotonero, Melón, Mostaza china, Olivo de verdeo, Pepino, Rúcula, Tabaco, Tomate, Vid	3
Ajo, Apio, Cebolla, Cerezo, Ciruelo, Col de Bruselas, Endrino, Olivo de almazara, Puerro, Zanahoria	7
Patata, Pimiento	14
Alfalfa, Algodonero	15
Almendro, Colza, Naranja, Remolacha azucarera, Toronja, pomelo, Trigo	30
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Chopos y álamos, Espárrago, Ornamentales herbáceas	NA



Condiciones Generales de Uso

Modo de aplicación:

Aire libre: En naranjo y toronja/pomelo un único tratamiento, mediante pulverización manual o normal con tractor, o pulverización manual de bajo y ultra bajo volumen, o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen. En manzano, albaricoque, melocotón, vid, olivo para verdeo, brécol, coliflor,, judías, habas, achicoria (hojas), berro, mastuerzo, canónigo, rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea, colleja, brotes tiernos, guisante, puerro, apio, tabaco, álamo (viveros), pepino, fresa, berenjena, calabacín y calabaza, flores, ornamentales y viveros, pulverización manual o normal con tractor, o pulverización manual de bajo y ultra bajo volumen, o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días.

En patata y pimiento el intervalo entre aplicaciones será de 14 días

En trigo, almendro, cerezo, ciruelo, endrino, olivo para almazara, ajo, melón, cebolla, tomate y zanahoria, pulverización manual o normal con tractor, o pulverización manual de bajo y ultra bajo volumen, o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 14 días. En cebada, maíz, colza, algodón, alfalfa, pulverización normal con tractor o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días.

En coles de Bruselas, pulverización manual o normal con tractor, o pulverización manual de bajo y ultra bajo volumen, o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.

En espárrago, únicamente en aplicaciones después de la cosecha. Un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 días.

En remolacha azucarera, pulverización normal con tractor o pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, una única aplicación por campaña.

Invernadero: En pepino, fresa, berenjena, tomate en invernadero, calabacín y calabaza, flores, ornamentales herbáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales, pulverización manual, un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 días.



Clase de Usuario
Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador:

Aire libre:

En todos los usos autorizados al aire libre MENOS trigo, cebada, maíz, colza, algodón, alfalfa y remolacha, en pulverización manual de bajo y ultra bajo volumen, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento de equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 ó 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009)

En todos los usos autorizados al aire libre, en pulverización manual, pulverización normal con tractor, o en pulverización con tractor de bajo y ultra bajo volumen, y en álamo pintado al tronco, durante la mezcla/carga, aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se deberán utilizar guantes de protección química.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

En invernadero:

En pepino, berenjena, tomate, calabacín, calabaza, ornamentales herbáceas y arbustos y pequeños árboles ornamentales, en pulverización manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento de equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 6 de acuerdo a norma UNE-EN13034:2005 + A1:2009).

En fresa y flores, en pulverización manual, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento, se deberán utilizar guantes de protección química.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

Seguridad del trabajador:

En vid se deberán utilizar guantes de protección química para tareas de 8 horas.

En caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizaran botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección adecuados.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

☐ Otras leyendas e indicaciones.

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.