



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |               |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div></div><div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div></div> <div><div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div></div> |                                                                                                                                                                                      | 24814         | SONG |      |                 | SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                                  |  |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |               |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
| Berenjena                                                                                                                                                                                               | Botrytis spp.<br>Cladosporiosis del tomate,<br>Fulvia fulva<br>Royas, Pucciniaceae                                                                                                   |               |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Sclerotinia spp.                                                                                                                                                                     | 0,04 - 0,1 %  | 1-3  | 7 d  | 500 - 1000 l/ha |                                                                                                                                                                  |  |
| Calabacín                                                                                                                                                                                               | Botrytis spp.<br>Cladosporiosis del pepino,<br>Cladosporium cucumerinum<br>Sclerotinia spp.                                                                                          | 0,04 - 0,1 %  |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Oídio, Golovinomyces cichoracearum<br>Oídio, Podosphaera fuliginea                                                                                                                   | 0,05 %        | 1-3  | 7 d  |                 | Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                                                                                                          |  |
| Calabaza                                                                                                                                                                                                | Botrytis spp.<br>Cladosporiosis del pepino,<br>Cladosporium cucumerinum<br>Sclerotinia spp.                                                                                          | 0,04 - 0,1 %  |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Oídio, Golovinomyces cichoracearum<br>Oídio, Podosphaera fuliginea                                                                                                                   | 0,05 %        | 1-3  | 7 d  |                 | Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                                                                                                          |  |
| Cebada                                                                                                                                                                                                  | Helmintosporiosis de cereales, Pyrenophora spp.<br>Oídio de los cereales, Blumeria graminis<br>Roya, Puccinia spp.<br>Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum |               |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici                                                                                                                                          | 1 l/ha        | 1-2  | 15 d | 200 - 400 l/ha  |                                                                                                                                                                  |  |
| Centeno                                                                                                                                                                                                 | Helmintosporiosis de cereales, Pyrenophora spp.<br>Oídio de los cereales, Blumeria graminis<br>Roya, Puccinia spp.<br>Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum |               |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici                                                                                                                                          | 1 l/ha        | 1-2  | 21 d | 100 - 500 l/ha  | Aplicar al final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.                |  |
| Manzano                                                                                                                                                                                                 | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha                                                                                        | 0,06 - 0,09 % | 1    | -    |                 | No superar la dosis máxima de 1 l/ha.<br>A partir de la formación del fruto se limita la dosis máxima a 0,8 l/ha.<br>Aplicar en primavera ó comienzos de verano. |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                              |               |      |      |                 | No superar la dosis máxima de 1 l/ha.<br>A partir de la formación del fruto se limita la dosis máxima a 0,8 l/ha.<br>Aplicar en primavera ó comienzos de verano. |  |
| Melocotonero                                                                                                                                                                                            | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa                                                                                                                                                 | 0,06 - 0,1 %  | 1    | -    |                 | No superar la dosis máxima de 1 l/ha.<br>A partir de la formación del fruto se limita la dosis máxima a 0,8 l/ha.<br>Aplicar en primavera ó comienzos de verano. |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Botrytis spp.<br>Cladosporiosis del pepino,<br>Cladosporium cucumerinum<br>Sclerotinia spp.                                                                                          | 0,04 - 0,1 %  |      |      |                 |                                                                                                                                                                  |  |

|           |                                                                |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melón     | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                             |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Oídio, Podosphaera fuliginea                                   | 0,05 %        | 1-3 | 7 d  |                 | Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                                                                                                          |
| Olivo     | Repilo del olivo, Venturia oleaginea                           | 0,06 %        | 1   | -    |                 | Dosis máxima: 0,48 l/ha.<br>No aplicar hasta finales de invierno o primavera antes de la floración.                                                              |
| Pepino    | Botrytis spp.                                                  |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Cladosporiosis del pepino, Cladosporium cucumerinum            |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Sclerotinia spp.                                               | 0,04 - 0,1 %  |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                             |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Pepino    | Oídio, Podosphaera fuliginea                                   | 0,05 %        | 1-3 | 7 d  |                 | Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                                                                                                          |
| Peral     | Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium             |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina                      |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Peral     | Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha                     | 0,06 - 0,09 % | 1   | -    |                 | No superar la dosis máxima de 1 l/ha.<br>A partir de la formación del fruto se limita la dosis máxima a 0,8 l/ha.<br>Aplicar en primavera ó comienzos de verano. |
| Sandía    | Botrytis spp.                                                  |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Cladosporiosis del pepino, Cladosporium cucumerinum            |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Sclerotinia spp.                                               | 0,04 - 0,1 %  |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                             |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Sandía    | Oídio, Podosphaera fuliginea                                   | 0,05 %        | 1-3 | 7 d  |                 | Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                                                                                                          |
| Tomate    | Botrytis spp.                                                  |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Cladosporiosis del tomate, Fulvia fulva                        |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Tomate    | Sclerotinia spp.                                               | 0,04 - 0,1 %  | 1-3 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha |                                                                                                                                                                  |
| Trigo     | Helmintosporiosis de cereales, Pyrenophora spp.                |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Oídio de los cereales, Blumeria graminis                       |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Roya, Puccinia spp.                                            |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Trigo     | Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici                    | 1 l/ha        | 1-2 | 15 d | 200 - 400 l/ha  |                                                                                                                                                                  |
| Triticale | Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
|           | Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici                    | 1 l/ha        | 1   | -    | 200 - 400 l/ha  |                                                                                                                                                                  |
| Vid       | Botrytis spp.                                                  |               |     |      |                 |                                                                                                                                                                  |
| Vid       | Oídio de la vid, Erysiphe necator                              | 0,04 - 0,1 %  | 1-3 | 14 d |                 | No superar la dosis máxima de 0,4 l/ha.                                                                                                                          |

| Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| USO                                                                  | P.S. (días) |
| Berenjena, Calabacín, Pepino, Tomate                                 | 3           |
| Albaricoquero, Calabaza, Manzano, Melocotonero, Melón, Peral, Sandía | 7           |
| Vid                                                                  | 14          |
| Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale                             | 35          |
| Olivo                                                                | NO PROCEDE  |



Condiciones Generales de Uso

Aplicar solo en cultivos al aire libre mediante pulverización normal con tractor.  
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.



Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del APLICADOR:  
• MEZCLA, CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de protección química.

• APLICACIÓN:  
En frutales de pepita y de hueso:  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de protección química.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire se podrá prescindir de los guantes de protección química, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.

En el resto de usos: Ropa de trabajo.

Seguridad del TRABAJADOR:  
- En frutales de hueso, cucurbitáceas de piel comestible y de piel no comestible, tomate y berenjena: ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). En frutales de hueso, se respetará además el plazo de reentrada fijado.  
- En el resto de usos: ropa de trabajo.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):  
12 días en frutales de pepita.  
6 días en vid y olivo.  
5 días en frutales de hueso.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO  
- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.  
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.  
- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.  
- Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.  
- Se respetará una banda de seguridad de 10 m a zonas residenciales para frutales de pepita. Se restringirá el acceso a toda persona ajena al tratamiento durante la aplicación del producto en dicha banda de seguridad.



