





GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

13688

DELTAPLAN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

|                                          |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Algodonero                               | Trips                                                                                                                                                        | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Neophilaenus campestris<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Almendro                                 | Orugueta, Aglaope infausta                                                                                                                                   | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.<br><br>Lepidópteros<br><br>Moscas blancas, Aleyrodidae                               |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Trips                                                                                                                                                        | 0,3 - 0,5 l/ha | Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae<br><br>Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina                                                                          | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae<br><br>Chinche verde, pudenta, Nezara viridula<br><br>Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Lepidópteros                            |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Berenjena                                | Trips                                                                                                                                                        | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Bulbos hortícolas                        | Trips                                                                                                                                                        | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Cereales de invierno / primavera         | Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata                                                                                                            | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones (la 1ª en otoño) y las 2 siguientes en primavera, con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Cereales de verano                       | Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata                                                                                                            | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando 2 aplicaciones en primavera, con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                           |
|                                          | Chinches, heterópteros                                                                                                                                       |                | (Uso secundario). Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                 |
|                                          | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Neophilaenus campestris<br>Espumadora, Philaenus spumarius                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Cerezo                                   | Lepidópteros                                                                                                                                                 | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                   |
|                                          | Cécido del champiñón, Mycophila speyeri<br>Esciárido del champiñón, Lycoriella auripila                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                |
| Champiñón                                | Fórido del champiñón, Megaselia halterata                                                                                                                    | 0,03 %         | Aplicar mediante sistemas automáticos de riego o pulverización manual con mochila, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, con un máximo de 0,3 l/Ha.                                     |



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

13688

DELTAPLAN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

|               |                                                                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciruelo       | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Lepidópteros | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                                                                                                      |
|               | Espumadora, Neophilaenus campestris<br>Espumadora, Philaenus spumarius                                                                                                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colza         | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Lepidópteros | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,3 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                                                                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Coníferas     | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Trips        | 0,3 - 0,5 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental<br>Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.<br>[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
|               | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.<br><br>Lepidópteros<br><br>Moscas blancas, Aleyrodidae                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cucurbitáceas | Tefrítidos, Tephritidae                                                                                                                                                                     | Lepidópteros | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                                                                                                       |
|               | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Endrino       | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Lepidópteros | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.<br>Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.                                                                                                          |
|               | Espumadora, Neophilaenus campestris<br>Espumadora, Philaenus spumarius                                                                                                                      |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eriales       | Espumadora, Neophilaenus campestris                                                                                                                                                         | Ortópteros   | 0,03 - 0,05 %  | El tratamiento contra Ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.                                                                                                                       |
|               | Espumadora, Philaenus spumarius                                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frondosas     | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Trips        | 0,3 - 0,5 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental<br>Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.<br><br>Lepidópteros<br><br>Moscas blancas, Aleyrodidae                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                 | Lepidópteros |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum<br>Hoplocampa, Hoplocampa spp.<br><br>Lepidópteros |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                            |                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales de pepita                         | Psílidos, Psyllidae                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina | 0,03 - 0,05 % | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                             |
| Girasol                                    | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Lepidópteros                                     | 0,03 %        | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,3 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                             |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles    | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Lepidópteros                                     | 0,03 - 0,05 % | Excepto perifollo. Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. En perifollo se podrán realizar hasta 3 aplicaciones.                    |
| Hortalizas del género Brassica             | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Lepidópteros                                     | 0,03 - 0,05 % | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. No se autoriza el uso en berza, coles de Bruselas, colirrábanos y repollo.                  |
| Lechuga                                    | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Lepidópteros                                     | 0,03 %        | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días con un máximo de 0,3 l/Ha de producto por aplicación en invernadero. Al aire libre se podrá aplicar a 0,03-0,05% sin superar 0,5 l/ha por aplicación. |
| Leguminosas de grano                       | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Curculiónidos, Curculionidae                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leguminosas verdes (frescas)               | Lepidópteros                                     | 0,03 - 0,05 % | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                             |
|                                            | Lepidópteros                                     | 0,03 - 0,05 % | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                             |
| Lima                                       | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Espumadora, Philaenus spumarius                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Prays, polilla de los cítricos, Prays citri      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Psílidos, Psyllidae                              | 0,03 %        | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.                                                                                                                                                                        |
| Limonero                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Espumadora, Philaenus spumarius                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Prays, polilla de los cítricos, Prays citri      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Psílidos, Psyllidae                              | 0,03 %        | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.                                                                                                                                                                        |
| Maíz                                       | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.         |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Heliothis, Helicoverpa spp.                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Piral del maíz, O.nubilalis                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Taladros del maíz, Sesamia spp.                  | 0,03 - 0,05 % | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                                                                                             |
| Mandarino (incluido clementino e híbridos) | Áfidos, pulgones, Aphididae                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Espumadora, Philaenus spumarius                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Prays, polilla de los cítricos, Prays citri      |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Psílidos, Psyllidae                              | 0,03 %        | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.                                                                                                                                                                        |



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

13688

DELTAPLAN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melocotonero           | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Neophilaenus campestris<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Lepidópteros                                                                                 | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Melón                  | Galeruca del melón, Aulacophora foveicollis<br>Vacanita del melonar, Epilachna chrysomelina                                                                                                           | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 7 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.  |
| Naranja                | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Prays, polilla de los cítricos, Prays citri<br>Psílidos, Psyllidae                                                                  | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.                                                                            |
| Nogal                  | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Agusanado del castaño, Cydia splendana, C.fagiglandana                                                                                                                 | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
| Olivo                  | Glifodes, Margaronia unionalis<br>Prays, polilla del olivo, Prays oleae                                                                                                                               | 0,03 - 0,05 %  | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |
|                        | Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Mosca del olivo, Bactrocera oleae                                                                               |                | Efectuar el tratamiento en bandas con un volumen de caldo de 20 l/Ha..                                                                                       |
| Ornamentales herbáceas | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.<br>Heliothis, Helicoverpa spp.<br><br>Lepidópteros<br>Moscas blancas, Aleyrodidae<br>Trips | 0,3 - 0,5 l/ha | Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                 |
| Palmáceas              | Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti<br>Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus                                                                                               | 0,3 - 0,5 l/ha | [Uso secundario] Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                |
|                        | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.<br>Lepidópteros<br>Moscas blancas, Aleyrodidae                                                                                |                |                                                                                                                                                              |
|                        | Trips                                                                                                                                                                                                 |                | Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                 |
|                        | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div> |                                                                                                                       |  <div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div>                   |                                                                                                                                                                                | 13688 | DELTAPLAN | SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Patata                                                                                                      | Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata<br>Lepidópteros                                                    | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                   |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Pimiento                                                                                                    | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Chinche verde, pudenta, Nezara viridula<br>Heliothis, Helicoverpa spp.<br>Lepidópteros | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                   |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Trips                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Pinos                                                                                                       | Escolítidos, Scolytidae<br>Gorgojos del pino, Pissodes spp.                                                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | En árboles cebo. Incluye pino piñonero.                                                                                                                                        |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Procesionaria, Thaumetopoea spp.                                                                                      |                                                                                                                                                              | Tratamientos localizados. Incluye pino piñonero.                                                                                                                               |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Plátanos de sombra                                                                                          | Tigre del plátano de paseo, Corythucha ciliata                                                                        | 0,3 - 0,5 l/ha                                                                                                                                               | Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                                   |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Puerro                                                                                                      | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Lepidópteros                                                                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.                   |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Remolacha azucarera                                                                                         | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Lepidópteros                                                                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.                                                                                              |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Remolacha de mesa                                                                                           | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Lepidópteros                                                                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.                                                                                              |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Remolacha forrajera                                                                                         | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Lepidópteros                                                                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.                                                                                              |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Tabaco                                                                                                      | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Lepidópteros                                                                           | 0,03 - 0,5 %                                                                                                                                                 | Aplicar un máximo de 0,5 l/Ha. y aplicación.                                                                                                                                   |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Tomate                                                                                                      | Chinches, heterópteros                                                                                                | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                                                | (Uso secundario). Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Áfidos, pulgones, Aphididae                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Chinche verde, pudenta, Nezara viridula                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Heliothis, Helicoverpa spp.                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Lepidópteros                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
| Trips                                                                                                       |                                                                                                                       | Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación. |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |
|                                                                                                             | Áfidos, pulgones, Aphididae<br>Espumadora, Philaenus spumarius<br>Prays, polilla de los cítricos, Prays citri         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                 |  |                                                                                  |



| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Irritación cutánea. Categoría 2.<br>Lesiones oculares graves. Categoría 1.<br>Líquidos inflamables. Categoría 3.<br>Peligro por aspiración. Categoría 1.<br>Toxicidad aguda (oral e inhalatoria). Categoría 4.<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pictograma                                     |  GHS02 (llama)<br> GHS05 (corrosión)<br> GHS07 (signo de exclamación)<br> GHS08 (peligro para la salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Palabra de Advertencia                         | Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicaciones de Peligro                        | H226 -Líquidos y vapores inflamables.<br>H302+H332 -Nocivo en caso de ingestión o inhalación.<br><br>H315 -Provoca irritación cutánea.<br>H318 -Provoca lesiones oculares graves.<br>H335 -Puede irritar las vías respiratorias.<br><br>H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo.<br><br>H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consejos de Prudencia                          | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P370+P378 -En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante)<br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P331 -NO provocar el vómito. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos, 20 en viñedo y 30 m. en frutales hasta las masas de agua superficial.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).  
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

- Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6)
- Alquilbencensulfonato de calcio (CAS 68953-96-8) en isobutanol (CAS 78-83-1)

La nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-95-6 debe tener un contenido en benceno menor del 0,1 %.

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general (ornamentales), en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento

P403+P233+P235 -Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.

