

Datos del Producto									
Número de Registro: 23545		Estado: Vigente		Fechas		Inscripción: 23/09/2008		Renovación: 30/06/2028	
Nombre Comercial: DECIS PROTECH									

BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 SantJoanDespi

(Barcelona)

ESPAÑA

BAYER S.A.S. (LYON)

74 rue Gorge de Loup

69009 LyonCedex09

FRANCIA

DELTAMETRIN 1,5% [EW] P/V

Jardinería exterior doméstica: pipetas monodosis de 4 ml. en PET y frasco monodosis de 10 ml. en vidrio (boca 10 ml). Botellas de 25, 125 y 250 ml. Envase de 100 ml.
Uso profesional: Botella de plástico de 1 l.
Garrafas de plástico de 5 (boca 45 o 63 mm.) y 10 l. (boca 54 mm.). Botellas de 25 y 250 ml.

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Ajo	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Albaricoquero	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	23545			DECIS PROTECH		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
						DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Berenjena	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.			
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula						
	Heliothis, Helicoverpa spp.	Lepidópteros					
Brécol	Áfidos, pulgones, Aphididae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.			
	Chinches, heterópteros						
Calabacín	Tefrítidos, Tephritidae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.			[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Calabaza	Tefrítidos, Tephritidae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Cebolla	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			
Cebolleta	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			
Cerezo	Áfidos, pulgones, Aphididae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			
Chalote	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			
Champiñón	Cécido del champiñón, Mycophila speyeri		0,05 %	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña a dosis de 50-100 l. de caldo por 100 m2 del área de cultivo, 2/3 sobre el cultivo y el resto en el local.			
	Escíarido del champiñón, Lycoriella auripila						
Ciruelo	Fórido del champiñón, Megaselia halterata	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.			
Col de China	Áfidos, pulgones, Aphididae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.			
	Chinches, heterópteros						
Coliflor	Áfidos, pulgones, Aphididae	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.			
	Chinches, heterópteros						

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		23545		DECIS PROTECH		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.								
	Lepidópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae								
Coníferas	Trips	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Exclusivamente para usos ornamentales.					
Endrino	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.					
Eriales	Ortópteros	0,05 - 0,083 %		El tratamiento contra Ortópteros es aplicable igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de dosis y plazo de seguridad.					
Espárrago	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Criocer​os del espárrago, Crioceris asparagi, C. duodecimpunctata	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, que deberán ser posteriores a la recolección del espárrago.					
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros								
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.					
Frondosas	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.								
	Lepidópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae								
Frondosas	Trips	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Exclusivamente para usos ornamentales.					
Guisante verde	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.					
Haba verde	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.					
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar una única aplicación por campaña.					
Judía verde	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.					
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.					
Lima	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri								
	Psílidos, Psyllidae	0,05 %		Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.					
	Áfidos, pulgones, Aphididae								



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

23545

DECIS PROTECH

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Limonero	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri		
	Psílidos, Psyllidae	0,05 %	Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.
Maíz dulce	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Heliothis, Helicoverpa spp.		
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri		
	Psílidos, Psyllidae	0,05 %	Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.
Manzano	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella		
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum		
	Lepidópteros		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Melocotonero	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Mosquito verde, Asymmetrasca decedens	0,05 - 0,083 %	Se incluye nectarino. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Melón	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Crisomélidos, Chrysomelidae		
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Naranja	Áfidos, pulgones, Aphididae	
Prays, polilla de los cítricos, Prays citri			
Psílidos, Psyllidae		0,05 %	Efectuar una única aplicación por campaña.
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.		
	Heliothis, Helicoverpa spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti		

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

23545

DECIS PROTECH

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Palmáceas	Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus		[Uso secundario] Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Palmera datilera	Picudo de las cuatro manchas, Diocalandra frumenti		[Uso secundario] Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).
	Picudo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus		
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.		
	Lepidópteros		
	Moscas blancas, Aleyrodidae		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña. Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).
Pepinillo	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
Pepino	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
Peral	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella		
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.		
	Lepidópteros		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Psílidos, Psyllidae		
	Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Pimiento	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula		
	Heliothis, Helicoverpa spp.		
	Lepidópteros		
	Trips	0,05 - 0,083 %	Efectuar 3-4 tratamientos por campaña.
Puerro	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	
			Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

Rábano	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Lepidópteros		
Rábano	Pulguilla de la col, Phyllotreta spp.		
	Pulguilla de la col, Psylliodes chrysocephala	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
Sandía	Tefrítidos, Tephritidae		[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
Sandía	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Cécido del champiñón, Mycophila speyeri		
Setas	Escírido del champiñón, Lycoriella auripila		
	Fórido del champiñón, Megaselia halterata	0,05 %	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña a dosis de 50-100 l. de caldo por 100 m2 del área de cultivo, 2/3 sobre el cultivo y el resto en el local.
Tomate	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula		
Tomate	Heliothis, Helicoverpa spp.		
	Lepidópteros		
Tomate	Trips	0,05 - 0,083 %	En tomate en campo, efectuar 3-4 tratamientos por campaña. En tomate en invernadero, efectuar un máximo de tres aplicaciones y a la dosis máxima por aplicación de 0,833 l/ha.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
Toronja, pomelo	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri		
	Psílidos, Psyllidae	0,05 %	Efectuar una única aplicación por campaña.
Vid	Chinches, heterópteros		
	Mosquito verde, Jacobiasca lybica		
Vid	Mosquitos verdes, Empoasca spp.		
	Piral de la vid, Sparganothis pilleriana		
Vid	Polilla del racimo, Lobesia botrana		Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,05 - 0,083 %	Tratar al desborre.
Vid	Saltahojas de la vid, Scaphoides titanus	0,05 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
Zanahoria	Lepidópteros	0,05 - 0,083 %	Efectuar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Albaricoquero, Berenjena, Calabacín, Calabaza, Champiñón, Fresal, Maíz dulce, Melocotonero, Melón, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Sandía, Setas, Tomate	3
Ajo, Brécol, Cebolla, Cebolleta, Cerezo, Chalote, Ciruelo, Col de China, Coliflor, Endrino, Eriales, Guisante verde, Haba verde, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Judía verde, Lechuga, Manzano, Peral, Puerro, Rábano, Vid, Zanahoria	7
Lima, Limonero, Mandarino (incluido clementino e híbridos), Naranja, Toronja, pomelo	30
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Espárrago, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera	NP



Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal.

SPa 1: Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga deltametrin más de las veces que se indica en la resolución para cada cultivo. En cultivos al aire libre no superar los 0,833 l/Ha. (excepto en madarino, limonero y lima, que la dosis será de 0,5 l/ha). En cultivos protegidos no superar los 1,166 l/Ha. Cuando se indican 2 valores en el nº de aplicaciones, el más bajo hace referencia a cultivos al aire libre y el más alto a cultivos protegidos.

Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Autorizado para jardineria exterior doméstica.

Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados en las operaciones de mezcla, carga y aplicación, además de ropa de protección en tronco y piernas.

En el cultivo de champiñón además mascarilla autofiltrante FFP2 durante la aplicación.

El retorno a la faena en las áreas tratadas, no debe realizarse durante las primeras 24 horas tras la aplicación, salvo que se trate de actividades que no impliquen el contacto con el cultivo, utilizando en este caso el equipo de protección personal requerido para la aplicación. Durante las siguientes 24 h se deberá usar guantes de protección química y ropa de protección.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla

SPo5: Ventilar los recintos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

