

Datos del Producto													
Número de Registro:		18640	Estado:		☒ Vigente	Fechas		Inscripción:	13/06/1990	Renovación:		Caducidad:	31/07/2028
Nombre Comercial:		FOLICUR 25 EW											

Titular	Fabricante
BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) Avda. Baix Llobregat 3-5 08970 SantJoanDespi (Barcelona) ESPAÑA	BAYER AG (LEVERKUSEN) Kaiser Wilhelm Allee 1 51373 (Leverkusen) ALEMANIA

Composición
TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V

Envases
Botella/bidón de PHED de 1 l (ancho de boca: 50 mm), 1,2 l (ancho de boca: 50 mm), 3 l (ancho de boca: 63 mm) y 5 l (ancho de boca: 63 mm).

Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Cebada	Helmintosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres		
	Oídio de los cereales, Blumeria graminis		
	Roya, Puccinia spp.		
	Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum		
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	1 l/ha	Número máximo de aplicaciones: 2, desde fin de ahijado hasta fin de floración. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 14 días.
Cítricos	Penicilium, Penicillium spp.	0,4 %	
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,06 %	Dosis máxima: 0,6 l/ha. Un único tratamiento antes de la floración en primavera.
Trigo	Helmintosporiosis del trigo, Pyrenophora tritici-repentis		
	Oídio de los cereales, Blumeria graminis		
	Roya, Puccinia spp.		
	Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum		
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	1 l/ha	Número máximo de aplicaciones: 2, desde fin de ahijado hasta fin de floración. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 14 días.
Vid de vinificación	Botrytis spp.		
	Oídio de la vid, Erysiphe necator	0,04 - 0,1 %	Dosis máxima: 0,5 l/ha. Una única aplicación por campaña.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Vid de vinificación	21
Cebada, Trigo	35
Cítricos, Olivo	NP

Condiciones Generales de Uso

Métodos de aplicación:

- Pulverización normal con tractor en trigo, cebada, olivo y uva de vinificación.
- Pulverización manual en olivo y uva de vinificación.
- Pulverización centrífuga con tractor en olivo y uva de vinificación.
- En cítricos, aplicar mediante ducha (sistema drencher) en el momento de recepción previamente a la entrada en la cámara. Alternativamente se podrá aplicar mediante pulverización en túnel sobre la cinta transportadora antes del encerado o bien en mezcla con las ceras autorizadas.

En la etiqueta se darán las instrucciones para la correcta aplicación del producto en los distintos casos, especificando las especies de roya contra las que es eficaz, e indicando la conveniencia de alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencia.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.
Uso reservado a centrales hortofrutícolas.



Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador:
Se utilizarán guantes de protección química en mezcla-carga en todos los usos autorizados.
En aplicación cuando la pulverización sea normal con tractor y manual, se utilizarán guantes de protección química, ropa de protección química (equipo tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005+A1:2009) y calzado adecuado en trigo, cebada, olivo y uva de vinificación. En aplicación cuando la pulverización sea centrífuga con tractor, se utilizarán guantes de protección química en olivo y uva de vinificación.

El trabajador:
Se utilizarán guantes de protección química en cítricos post-cosecha, cuando la aplicación se realice mediante drencher.
En uva de vinificación se usarán guantes de protección química, cuando la pulverización sea normal con tractor y manual, así como cuando sea pulverización centrífuga con tractor. Protección aplicable para tareas de más de 2h de duración y reentrada aplicable para tareas de más de 2h de duración.
En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
No tratar con este producto en aquellas labores que impliquen actividades mecánicas que puedan derivar a un deterioro de los guantes de protección química en el trabajador durante la reentrada de este a la finca.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.
SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.



Otras Indicaciones reglamentarias

Contiene además del ingrediente activo técnico: N,N-dimetildecán-1-amida (CAS 14433-76-2).
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento

P403+P233 -Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

