

Datos del Producto

Número de Registro: 21450

Estado: ☒ Vigente

Fechas

Inscripción: 04/02/1997

Renovación:

Caducidad: 31/07/2028

Nombre Comercial: FOLICUR 25 WG

Titular

BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona)

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 SantJoanDespi

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BAYER AG (LEVERKUSEN)

Kaiser Wilhelm Allee 1

51373

(Leverkusen)

ALEMANIA

Composición

TEBUCONAZOL 25% [WG] P/P

Envases

Bolsa de 16 g: film composite de poliéster/aluminio/polietileno.
Botella de 250 ml: EVOH.
Caja de cartón con bolsa interior de poliéster/alu/polietileno: 1 kg.
Caja de cartón con bolsa interior de papel/aluminio: 5 kg.
Saco de aluminio: 5 kg.

Página 1 de 4

114416 - 2026215

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Albaricoquero	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					
	Monilia, Monilinia spp.					
	Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla	0,05 - 0,075 %	2	14 días	500 - 1.000 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,75 kg/ha.
Cerezo	Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, Blumeriella jaapii					
	Monilia, Monilinia spp.	0,05 - 0,075 %	2	14 días	500 - 1.000 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,75 kg/ha.
Ciruelo	Monilia, Monilinia spp.	0,05 - 0,075 %	2	14 días	500 - 1.000 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,75 kg/ha.
Endrino	Monilia, Monilinia spp.	0,05 - 0,075 %	2	14 días	500 - 1.000 l/ha	Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. No superar la dosis máxima de 0,75 kg/ha.
Manzano	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis					
	Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha	0,04 - 0,06 %	2	10-25 días	500 - 1.000 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,6 kg/ha.
Melocotonero	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					
	Monilia, Monilinia spp.					
	Oídio del rosal, Podosphaera pannosa	0,05 - 0,075 %	2	14 días	500 - 1.000 l/ha	Incluye nectarino. No superar la dosis máxima de 0,75 kg/ha.
Peral	Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium					
	Moteado o roña del peral, Venturia pyrina					
	Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha	0,04 - 0,06 %	2	10-25 días	500 - 1.000 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,6 kg/ha.
Vid de vinificación	Botrytis spp.					
	Oídio de la vid, Erysiphe necator	0,04 - 0,1 %	3	14-21 días	300 - 500 l/ha	No superar la dosis máxima de 0,5 kg/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Endrino, Melocotonero	7
Manzano, Peral	14
Vid de vinificación	21

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida autorizado al aire libre.Métodos de aplicación: Pulverización normal con tractor y pulverización con mochila.En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta utilización del producto, asimismo se informará sobre la posibilidad de aparición de resistencias y se propondrá una estrategia de prevención y manejo de las mismas.Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).