





|           |                                                                                                                                     |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajo       | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                                                                        |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |
|           | Alternaria spp.                                                                                                                     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 13 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |
| Alcachofa | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                                                                               |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                 |
|           | Alternaria spp.                                                                                                                     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                             |
| Almendro  | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans<br>Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus<br>Monilia, Monilinia spp. |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                                                                                     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
| Avellano  | Bacteriosis                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.  |
|           | Alternaria spp.                                                                                                                     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
| Berenjena | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                             |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp..<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|           | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans<br>Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                          |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes                                                                                     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                             |
|           | Colletotrichum spp.                                                                                                                 |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                       |
|           | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae                                                                         |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|          |                                                                   |              |     |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brécol   | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica             |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                 |
|          | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                             |
| Castaño  | Alternaria spp.                                                   |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                      |
|          | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                  |
| Cebolla  | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                      |
|          | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                      |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
| Chalote  | Alternaria spp.                                                   |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
|          | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans               |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                             |
| Cítricos | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 13 d | 400 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
|          | Alternaria spp.                                                   |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
| Cítricos | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans               |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
|          | Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                      |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                 |
| Cítricos | Mancha marrón de las mandarinas, Alternaria alternata f.sp. citri |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
|          | Phytophthora spp.                                                 |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Contra aguado causado por Phytophthora citrophthora y Ph.nicotinae var. parasitica.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
| Cítricos | Melanosis de los cítricos, Diaporthe citri                        | 0,1 %        | 1-4 | 7 d  | 1000 - 1900 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Contra Diaporthe citri (=Phomopsis citri). Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                             |
|          | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae       |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                 |
| Cítricos | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica             |              |     |      |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                 |
|          |                                                                   |              |     |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                     |                                                                                                                                                                                       |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coliflor                            | Colletotrichum spp.                                                                                                                                                                   |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                     |
|                                     | Bacteriosis                                                                                                                                                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                              |
| Cucurbitáceas de piel comestible    | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare<br>Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis<br>Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                              |
|                                     | Bacteriosis                                                                                                                                                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89. |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare<br>Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis<br>Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                               |
|                                     | Bacteriosis                                                                                                                                                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                           |
| Fresal                              | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                                                              |
| Frutales de hueso                   | Abolladura, lepra, Taphrina spp.<br>Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus                                                                                                    |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                                   |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                               |              |     |     |                 | Contra moteado (Venturia spp.).<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                |
|                                     | Venturia spp.                                                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                               |
| Frutales de pepita                  | Chancro europeo, Neonectria ditissima<br>Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                      |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                                                                                                      |
|                                     | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                                                                                                                                       |              |     |     |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                                  |
|                                     | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum                                                                                                                |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                               |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guisante verde      | Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                                                                    |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Bacteriosis                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Haba verde          | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum<br>lindemuthianum                                  |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                                                                    |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
| Haba verde          | Bacteriosis                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
|                     | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum<br>lindemuthianum                                  |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
| Judía verde         | Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                                                                    |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Bacteriosis                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Lechuga y similares | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Microdochium<br>panattonianum<br>Mildiu de la acelga,<br>Peronospora farinosa |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                                            |
|                     | Mildiu de la lechuga, Bremia<br>lactucae                                                                      |              |     |     |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                        |
| Nogal               | Bacteriosis                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                     | Alternaria spp.                                                                                               | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
| Olivo               | Repilo del olivo, Venturia<br>oleaginea                                                                       |              |     |     | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                     | Tuberculosis del olivo,<br>Pseudomonas savastanoi<br>pv. savastanoi                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 600 - 1000 l/ha | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 10-85.                                                                                                   |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                            |
|                                                                                                                                                  | Peronosporaceae                                                                                                                                               | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                           |
| Patata                                                                                                                                           | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                                    | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-85.                                                                                                                                                             |
| Pimiento                                                                                                                                         | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                               | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 13 d | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                        |
| Pistachero                                                                                                                                       | Alternaria spp.                                                                                                                                               |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                  | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                 |
| Pistachero                                                                                                                                       | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
| Tomate                                                                                                                                           | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans |              |     |      |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola |                                                                                                                                                               |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ajo                                                                                                                                              | Bacteriosis                                                                                                                                                   |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | Alternaria spp.                                                                                                                                               |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                                                  |
| Alcachofa                                                                                                                                        | Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                                                                                                         |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Alternaria spp.                                                                                                                                               |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans<br>Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus<br>Monilia, Monilinia spp.                           |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                                                                               |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almendro  | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                                                                                                               |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.  |
| Avellano  | Alternaria spp.                                                                                                                                               |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
|           | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                       |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.  |
| Berenjena | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
|           | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans<br>Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
| Brécol    | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
|           | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae<br>Colletotrichum spp.<br>Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica                   |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.<br>Uso menor por jerarquía.<br>Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59. |
| Castaño   | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                             |
|           | Alternaria spp.<br>Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                    |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
| Cebolla   | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.  |
|           | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans                                                                                        |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                             |
|           | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                        |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |

|                                     |                                                                   |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chalote                             | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                             |
| Cítricos                            | Phytophthora spp.                                                 | 0,1 %        | 1-4 | 7 d | 1000 - 1900 l/ha | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Contra aguado causado por Phytophthora citrophthora y Ph.nicotinae var. parasitica.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
|                                     | Melanosis de los cítricos, Diaporthe citri                        |              |     |     |                  | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Contra Diaporthe citri (=Phomopsis citri).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                          |
|                                     | Mancha marrón de las mandarinas, Alternaria alternata f.sp. citri |              |     |     |                  | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
| Coliflor                            | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                                 |
|                                     | Colletotrichum spp.                                               |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                    |
|                                     | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae       |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                                 |
|                                     | Bacteriosis                                                       |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                             |
| Cucurbitáceas de piel comestible    | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina    |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                         |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                          |
| Fresal                              | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                                                                             |
| Frutales de hueso                   | Venturia spp.                                                     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha  | Contra moteado (Venturia spp.).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                               |
|                                     | Abolladura, lepra, Taphrina spp.                                  |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus                    |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                                                  |
|                                     | Bacteriosis                                                       |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                              |
|                                     | Chancro europeo, Neonectria ditissima                             |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     |                                                                                                                                                      |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales de pepita  | Monilia, Monilinia spp.<br><br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                                                                       |              |     |     |                 | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                                                                                    |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                |
| Guisante verde      | Alternaria spp.<br><br>Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum<br><br>Mildiu del guisante, Peronospora viciae                            |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Haba verde          | Alternaria spp.<br><br>Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum<br><br>Mildiu del guisante, Peronospora viciae                            |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Judía verde         | Alternaria spp.<br><br>Antracnosis del haba, Colletotrichum lindemuthianum<br><br>Mildiu del guisante, Peronospora viciae                            |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Lechuga y similares | Alternaria spp.<br><br>Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae |              |     |     |                 | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                                            |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                        |
| Nogal               | Alternaria spp.<br><br>Monilia, Monilinia spp.                                                                                                       |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                     | Bacteriosis                                                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
| Olivo               | Repilo del olivo, Venturia oleaginea<br>Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 600 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 10-85.                                                                                                   |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                   | Peronosporaceae                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                          | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                                                    | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patata                                                                                                                                   | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                                                             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pimiento                                                                                                                                 | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                        | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pistachero                                                                                                                               | Alternaria spp.                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.<br>Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|                                                                                                                                          | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                                |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                          | Bacteriosis                                                                                                                                                                            | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tomate                                                                                                                                   | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vid                                                                                                                                      | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola                                                                                                                                                  | 0,15 %       | 1-4 | 20 d | 400 l/ha        | Dosis: 0,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp..<br>Dosis: 0.6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila |                                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ajo                                                                                                                                      | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                                                 | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                          | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alcachofa                                                                                                                                | Alternaria spp.<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                                                                                                               | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                          | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans<br>Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                                                            |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almendro  | Bacteriosis                                                                                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.  |
|           | Alternaria spp.<br><br>Monilia, Monilinia spp.                                                                             |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
| Avellano  | Bacteriosis                                                                                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp..<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|           | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans<br>Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                 |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
| Berenjena | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes                                                                            | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                             |
| Brécol    | Colletotrichum spp.                                                                                                        | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                    |
|           | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae<br><br>Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica   |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                 |
| Castaño   | Bacteriosis                                                                                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                             |
|           | Alternaria spp.<br><br>Monilia, Monilinia spp.                                                                             |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                      |
| Cebolla   | Bacteriosis                                                                                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                             |
|           | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans                                                                        |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |
| Chalote   | Bacteriosis                                                                                                                | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |
|           | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br><br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                 |

|                                     |                                                                   |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                            | Phytophthora spp.                                                 |              |     |     |                  | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Contra aguado causado por Phytophthora citrophthora y Ph.nicotinae var. parasitica.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
|                                     | Melanosis de los cítricos, Diaporthe citri                        |              |     |     |                  | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Contra Diaporthe citri (=Phomopsis citri). Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                             |
|                                     | Mancha marrón de las mandarinas, Alternaria alternata f.sp. citri | 0,1 %        | 1-4 | 7 d | 1000 - 1900 l/ha | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
| Coliflor                            | Colletotrichum spp.                                               |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                       |
|                                     | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae       |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                                 |
|                                     | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica             |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                                                                 |
| Cucurbitáceas de piel comestible    | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                         |
|                                     | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          |              |     |     |                  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                             |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina    |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                         |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                          |
| Fresal                              | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                                                                             |
| Frutales de hueso                   | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina    |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Abolladura, lepra, Taphrina spp.                                  |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                                                  |
|                                     | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus                    |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                              |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Venturia spp.                                                     |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                                                  |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                              |
|                                     | Chancro europeo, Neovectria ditissima                             |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                                                                                                                     |
|                                     | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                   |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales de pepita     | Bacteriosis                                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                |
| Guisante verde         | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum lindemuthianum<br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Haba verde             | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum lindemuthianum<br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Judía verde            | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum lindemuthianum<br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.     |
| Lechuga y similares    | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga,<br>Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                                            |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                        |
| Nogal                  | Alternaria spp.<br>Monilia, Monilinia spp.                                                                                                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
| Olivo                  | Repilo del olivo, Venturia oleaginea<br>Tuberculosis del olivo,<br>Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi                                            | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 10-85.                                                                                                   |
|                        |                                                                                                                                                     |              |     |     | 600 - 1000 l/ha |                                                                                                                                                                                                                |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae                                                                                                                                     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                           |
|                        | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                 |              |     |     |                 | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                            |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patata                                                                                                                                                 | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                                                             | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-85.                                                                                                                                                             |
| Pimiento                                                                                                                                               | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                        | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                        |
| Pistachero                                                                                                                                             | Alternaria spp.                                                                                                                                                                        | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                                                                                                                                                        | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                                |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
| Tomate                                                                                                                                                 | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                          | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
| Vid                                                                                                                                                    | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola                                                                                                                                                  | 0,15 %       | 1-4 | 20 d | 400 l/ha        | Dosis: 0,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 0.6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                      |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor |                                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Ajo                                                                                                                                                    | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                                                 | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                            |
| Alcachofa                                                                                                                                              | Alternaria spp.<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                                                                                                               | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-51.                                                            |
| Almendro                                                                                                                                               | Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans<br>Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                                                                                                                                                        | Bacteriosis                                                                                                                                                                            |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|                                                                                                                                                        | Alternaria spp.                                                                                                                                                                        |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |



|           |                                                                                                                                                               |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avellano  | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                       |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                      |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                  |
| Berenjena | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans<br>Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                      |
| Brécol    | Colletotrichum spp.<br>Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae<br>Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica                   |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía. Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                       |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                      |
| Castaño   | Alternaria spp.<br>Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                    |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                                      |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                  |
| Cebolla   | Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Alternaria spp.<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                        |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía. Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                                    |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                      |
| Chalote   | Alternaria spp.<br>Antracnosis de la cebolla, Colletotrichum circinans<br>Mildiu de la cebolla, Peronospora destructor                                        |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                                                                                                 |
|           | Bacteriosis                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-47.                                                                                             |
|           | Phytophthora spp.                                                                                                                                             |              |     |     |                 | (Limonero, mandarino, naranjo y pomelo).<br>Contra aguado causado por Phytophthora citrophthora y Ph.nicotinae var. parasitica.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |



|                                     |                                                                   |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cítricos                            | Melanosis de los cítricos, Diaporthe citri                        |              |     |     |                  | (Limonero, mandarino, naranja y pomelo).<br>Contra Diaporthe citri (=Phomopsis citri).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89. |
|                                     | Mancha marrón de las mandarinas, Alternaria alternata f.sp. citri | 0,1 %        | 1-4 | 7 d | 1000 - 1900 l/ha | (Limonero, mandarino, naranja y pomelo).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                               |
| Coliflor                            | Colletotrichum spp.                                               |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Contra antracnosis (Colletotrichum spp.).<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                           |
|                                     | Mancha negra, tizón de las crucíferas, Alternaria brassicae       |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Mildiu de las crucíferas, Hyaloperonospora parasitica             |              |     |     |                  | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                                                                                        |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-59.                                                    |
| Cucurbitáceas de piel comestible    | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          |              |     |     |                  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                    |
|                                     | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                    |
|                                     | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina    |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  |                                                                                                                                                                                                        |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare          |              |     |     |                  | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                     |
|                                     | Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis           |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                 |
|                                     | Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina    |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                                    |
| Fresal                              | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha  | Contra moteado (Venturia spp.).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                      |
| Frutales de hueso                   | Venturia spp.                                                     |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Abolladura, lepra, Taphrina spp.                                  |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus                    |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                                         |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                     |
| Frutales de pepita                  | Chancro europeo, Neonectria ditissima                             |              |     |     |                  | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.                                                                            |
|                                     | Monilia, Monilinia spp.                                           |              |     |     |                  | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 91-93 y BBCH 33-53.        |
|                                     | Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis                   |              |     |     |                  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | Bacteriosis                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha  |                                                                                                                                                                                                        |

|                        |                                                                                                                                                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guisante verde         | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum lindemuthianum<br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                             |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Haba verde             | Alternaria spp.<br>Antracnosis del haba,<br>Colletotrichum lindemuthianum<br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                             |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Judía verde            | Alternaria spp.<br><br>Mildiu del guisante,<br>Peronospora viciae                                                                                   |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                                                                                                |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 14-89.                                                            |
| Lechuga y similares    | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga,<br>Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae |              |     |     |                 | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                                            |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                        |
| Nogal                  | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                             |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                        | Bacteriosis                                                                                                                                         |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|                        | Alternaria spp.                                                                                                                                     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
| Olivo                  | Repilo del olivo, Venturia oleaginea                                                                                                                |              |     |     | 500 - 1000 l/ha |                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Tuberculosis del olivo,<br>Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi                                                                                    | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 600 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 4 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 10-85.                                                                                                   |
| Ornamentales herbáceas | Peronosporaceae                                                                                                                                     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                           |
|                        | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                 | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                            |
| Patata                 | Alternaria de las solanáceas,<br>Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,9 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-85.                                                                                                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pimiento                         | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                        |
| Pistachero                       | Alternaria spp.                                                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 500 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53.                                                                     |
|                                  | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                               |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,92 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar entre BBCH 33-53. |
|                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Tomate                           | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                                            |
|                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                        |
|                                  | Mildiu de la vid, Plasmopara viticola                                                                                                                                                 |              |     |      |                 | Dosis: 0,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                                                                                          |
| Vid                              | Bacteriosis                                                                                                                                                                           | 0,15 %       | 1-4 | 20 d | 400 l/ha        | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 0.6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-81&91.                                                                                      |
|                                  | Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla                                                     |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Berenjena                        | Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans<br>Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                            | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                |
|                                  | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                |
|                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,92 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                            |
| Cucurbitáceas de piel comestible | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare<br>Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis<br>Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                            |
|                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                                            |
|                                  |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                        |
| Fresal                           | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                                            |
| Lechuga y similares              | Alternaria spp.                                                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                                            |
|                                  | Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                                         |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                        |
|                                  | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                           |
|                                  | Peronosporaceae                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                    |     |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO DE ESPAÑA |     |  |                 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN                                                                                                                |  | ES-00979 |  | CUPROXI FLO |  | SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |  | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL |  |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                            | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 15 d                                                                            | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año. Aplicar en todos los estadios.                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Pimiento                                                                                                                                          | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla. Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                              |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Tomate                                                                                                                                            | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                         | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,92 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                                                 |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Dosis: 1,92 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                              |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola |                                                                                                                                                                                       |                    |     |                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Berenjena                                                                                                                                         | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                                                            | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía. Dosis: 1,6 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                       |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes                                                                                                                                       |                    |     |                                                                                 |                 | Uso menor por jerarquía. Dosis: 1,6 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                       |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                                                 |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Dosis: 1,6 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                                  | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare<br>Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis<br>Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                                                 |                 | Dosis: 1.54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Fresal                                                                                                                                                                                |                    |     |                                                                                 |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 10-89.                                              |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Lechuga y similares                                                                                                                               | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                      |                    |     |                                                                                 |                 | Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |                    |     |                                                                                 |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 12-49.                                              |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                            | Peronosporaceae                                                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 10 d                                                                            | 400 - 1000 l/ha | Contra mildius de la familia Peronosporaceae. Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año. Aplicar en todos los estadios. |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                                                   |                    |     |                                                                                 |                 | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año. Aplicar en todos los estadios.                                               |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
| Pimiento                                                                                                                                          | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 %       | 1-4 | 7 d                                                                             | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla. Dosis: 1,54 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                              |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                   | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                         |                    |     |                                                                                 |                 | Dosis: 1,6 l p.f./ha. Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                |  |          |  |             |  |                                                                 |  |                                                                                  |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tomate                                                                                                                                    | Bacteriosis                                                                                                                                                                           | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                               |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                      |
| Berenjena                                                                                                                                 | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                                                                            | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                       |
|                                                                                                                                           | Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                   |
| Cucurbitáceas de piel comestible                                                                                                          | Antracnosis, niebla del melón, Colletotrichum orbiculare<br>Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis<br>Tizón de las hojas de las cucurbitáceas, Alternaria cucumerina | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Dosis: 1.54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 10-89.                                                              |
| Fresal                                                                                                                                    | Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 13-85.                                                                                                                                  |
| Lechuga y similares                                                                                                                       | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Microdochium panattonianum<br>Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa<br>Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae                                      | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                           | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas y Xanthomonas.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 12-49.                                                                       |
|                                                                                                                                           | Peronosporaceae                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                 |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                    | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                  |
| Pimiento                                                                                                                                  | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani                                                                                                                                       | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Excepto pimiento tipo guindilla.<br>Dosis: 1,54 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                              |
| Tomate                                                                                                                                    | Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani<br>Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes<br>Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans                         | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | Bacteriosis                                                                                                                                                                           |              |     |      |                 | Eficaz exclusivamente contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp.<br>Dosis: 1,6 l p.f./ha.<br>Aplicar entre BBCH 15-89.                                                               |
|                                                                                                                                           | Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)                                       |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                      |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                  | Royas, Pucciniaceae                                                                                                                                                                   | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d  | 400 - 1000 l/ha | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                |
|                                                                                                                                           | Peronosporaceae                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año. |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |              |     |      |                 | Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                     |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coníferas                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae |              |     |     |                 | Solo para uso ornamental.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | Peronosporaceae     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                     |
| Frondosas                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     | Peronosporaceae     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                  |
| Palmáceas                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae |              |     |     |                 | Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     | Peronosporaceae     | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                  |
| Palmera datilera                                                                                                                                    | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Aplicar mediante mochila Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios. |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Aplicar mediante mochila pulverizadora de 5 l. Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                            |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                                     |
| Coníferas                                                                                                                                           | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                        |
| Frondosas                                                                                                                                           | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                                     |
| Palmáceas                                                                                                                                           | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                                                     |
| Palmera datilera                                                                                                                                    | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                          |
|                                                                                                                                                     | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                           |

|                                                                                                                                                           |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila               |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                                  | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Coníferas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                              |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                               |
| Frondosas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmáceas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmera datilera                                                                                                                                          | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios. |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                                  | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Coníferas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                              |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                               |
| Frondosas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmáceas                                                                                                                                                 | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmera datilera                                                                                                                                          | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios. |
|                                                                                                                                                           | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 7 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla                      |                     |              |     |     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           | Peronosporaceae     |              |     |     |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |

|                                                                                                                                                      |                     |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                             | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 15 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Coníferas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                              |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 15 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                               |
| Frondosas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 15 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmáceas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 15 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmera datilera                                                                                                                                     | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios. |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 15 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola |                     |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                             | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Coníferas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Solo para uso ornamental.<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                              |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Solo para uso ornamental.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                               |
| Frondosas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmáceas                                                                                                                                            | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |
| Palmera datilera                                                                                                                                     | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios. |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Uso menor por jerarquía.<br>Solo para uso ornamental (no apto para el consumo humano).<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila         |                     |              |     |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                             | Peronosporaceae     |              |     |      |                 | Contra mildius de la familia Peronosporaceae.<br>Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | Royas, Pucciniaceae | 0,15 - 0,3 % | 1-4 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima por tratamiento: 1,54 l p.f./ha y dosis máxima de 2,9 l p.f./ha/año.<br>Aplicar en todos los estadios.                                                                                                                                            |



Mitigación de riesgos en la manipulación

USO PROFESIONAL (aire libre e invernadero):

Seguridad del APLICADOR:  
Se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6, calzado de protección frente a productos químicos y ropa de protección parcial de nivel C3 o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 durante la mezcla/carga y guantes de protección química, ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6 y calzado de protección frente a productos químicos durante la aplicación.

Seguridad del TRABAJADOR:  
Se deberá utilizar ropa de trabajo o C1 y calzado cerrado durante la reentrada.

Normativa aplicable a los EPIs:  
- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.  
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.  
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.  
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.  
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II)  
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:  
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.  
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.  
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.  
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.  
SPo5 Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

USO NO PROFESIONAL:  
No se requiere la utilización de EPIs.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:  
- Se debe hacer uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.  
- Durante el manejo de los cultivos tratados, se debe hacer uso de ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Toxicidad aguda (oral). Categoría 4.                                                                                                                                                           |
| Pictograma                                     |  GHS07 (signo de exclamación)                                                                               |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                                       |
| Indicaciones de Peligro                        | H302 -Nocivo en caso de ingestión.                                                                                                                                                             |
| Consejos de Prudencia                          | P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1                                                                                                                                                         |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                                     |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                                       |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                         |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.           |

Mitigación de riesgos ambientales

SPe1: Para proteger los organismos del suelo no aplicar este ni ningún otro producto que contenga cobre a una dosis anual superior a 4 kg Cu/ha por año.

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m con cubierta vegetal para ajo, alcachofa, berenjena (aire libre), brécol, cebolla, chalote, coliflor, cucurbitáceas de piel comestible (aire libre), cucurbitáceas de piel no comestible, fresal (aire libre), guisantes verdes, judías verdes, habas verdes, lechuga y similares (aire libre), ornamentales herbáceas (aire libre), patata, pimiento (aire libre), tomate (aire libre) y vid de 20 m con cubierta vegetal para olivo, frutales de hueso, frutales de pepita, almendro, avellano, castaño, nogal, pistachero, arbustos y pequeños árboles ornamentales (aire libre), coníferas (aire libre), frondosas (aire libre), palmáceas (aire libre), palmera datilera (aire libre) y cítricos hasta las masas de aguas superficiales.

SPe8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Para los usos en invernadero retírense o cúbranse las colmenas durante la aplicación. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para parques y jardines según las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre.

Otros componentes además del ingrediente activo técnico: Etilenglicol (CAS 107-21-1).

Otras leyendas e indicaciones: Autorizado para uso no profesional. EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica. EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES.

- En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda “autorizado para uso no profesional” en caracteres preferentemente visibles.- Para el uso en aquellas zonas destinadas al uso público en general, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir el uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

