

Datos del Producto						
Número de Registro:	ES-01143	Estado:	☒ Vigente	Fechas	Inscripción:	09/12/2021
					Renovación:	
					Caducidad:	15/02/2027
Nombre Comercial:	KINVARA					

Titular	Fabricante
BARCLAY CHEMICALS (R&D) LTD. Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart (Dublin15) IRLANDA	BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING, Ltd. Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart (Dublin15) IRLANDA

Composición
MCPA 23,3% (c. sal potásica) + FLUROXIPIR 5% (c. ester meptilheptil) + CLOPIRALIDA 2,8% (c. sal etanolamina) [ME] P/V

Envases
Botellas de plástico (HDPE y f-HDPE) de 1 y 2 l. Garrafas de plástico (HDPE y f-HDPE) de 5 y 10 l. Bidón de plástico (HDPE y f-HDPE) de 20 l.

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Cebada	Dicotiledóneas anuales					
	Dicotiledóneas plurianuales					
	Monocotiledóneas plurianuales	2 - 3 l/ha	1	--	200 - 400 l/ha	Indicado para cebada de invierno y primavera. Aplicar durante BBCH 30-39.
Trigo	Dicotiledóneas anuales					
	Dicotiledóneas plurianuales					
	Monocotiledóneas plurianuales	2 - 3 l/ha	1	--	200 - 400 l/ha	Indicado para trigo de invierno y primavera. Aplicar durante BBCH 30-39.
Triticale	Dicotiledóneas anuales					
	Dicotiledóneas plurianuales					
	Monocotiledóneas plurianuales	2 - 3 l/ha	1	--	200 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 30-39.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Cebada, Trigo, Triticale	NO PROCEDE



Condiciones Generales de Uso

Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar con tractor.Los cultivos de raíces y tubérculos no deben implantarse como cultivos de rotación después de la aplicación de KINVARA. Los cultivos que se establezcan menos de 125 días después de la aplicación no serán tratados con KINVARA. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección química C1 o tipo 6 + delantal PB3 o PB4 o C3 + calzado resistente a productos químicos, y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección química C1 o tipo 6 + calzado resistente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.

NORMATIVA:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. En el caso del trabajador deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065:2017 /A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4] según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Página 2 de 4

114692 - 2026224

Otras Indicaciones reglamentarias

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.