

Almendro	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	0,05 %	1-2	14	1000 l/ha	
Apio	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %				
Apio	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	700 l/ha	
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Trips	0,05 %			500 - 1000 l/ha	
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %	1-3	7	700 l/ha	Aire libre e invernadero
Avellano	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros	0,03 %			1400 l/ha	Uso secundario.
	Lepidópteros	0,05 %	1-2	14	1000 l/ha	
Berenjena	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %				Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero
	Chinches, heterópteros					(Uso secundario). Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %				Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %	ver cond. esp.		600-1000 l/ha al aire libre y 600 -1400 l/ha en invernadero	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	7	300 - 500 l/ha	Aire libre e invernadero
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 %			1400 l/ha	
Castaño	Lepidópteros	0,05 %	1-2	14	1000 l/ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
Cebolla	Trips	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400 - 500 l/ha	
Cereales de invierno / primavera	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1		400 - 600 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.
Colza	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %	1-3	14	600 l/ha	
Cucurbitáceas	Chinches, heterópteros					(Uso secundario). Aire libre e invernadero
	Tefrítidos, Tephritidae					[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aire libre e invernadero
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %			600-1000 l/ha al aire libre y hasta 1400 l/ha en invernadero	Aire libre e invernadero
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400 - 500 l/ha	
Espárrago	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Crioceros del espárrago, Crioceris asparagi, C. duodecimpunctata					
Espárrago	Trips	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	600 - 1000 l/ha	Aplicar a la aparición de la plaga. Aplicación en campo posterior a la cosecha.
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-3	14	500 - 1000 l/ha	Aire libre e invernadero

 GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-00013 DELTAGRI		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Frutales de hueso	Chinches, heterópteros							(Ampliación a uso secundario). Excepto cerezo. Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.	
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Espumadora, Neophilaenus campestris								
Frutales de hueso	Espumadora, Philaenus spumarius								
	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %							
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 %	1			1000 - 1400 l/ha		Excepto cerezo. Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.	
Frutales de pepita	Chinches, heterópteros							(Uso secundario).	
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Espumadora, Philaenus spumarius	0,03 - 0,05 %	2						
	Lepidópteros	0,035 %				1000 - 1400 l/ha			
Girasol	Psila del peral, Cacopsylla pyri	0,05 %	1-2	14		1000 l/ha			
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
Guisante para grano	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %	1			600 l/ha		Efectuar una única aplicación al comienzo de la plaga	
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,25 l/ha							
	Lepidópteros								
Guisante verde	Trips					1000 l/ha			
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14		300 - 500 l/ha			
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,25 l/ha							
Hortalizas del género Brassica	Lepidópteros								
	Trips					1000 l/ha			
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14		300 - 500 l/ha			
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,05 %			7	500 - 1000 l/ha			
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14		400 - 500 l/ha			
Leguminosas de grano	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %							
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 - 0,057 %							
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14		500 - 1000 l/ha		Excepto judía, haba y guisante para grano	
Leguminosas verdes (frescas)	Lepidópteros	0,03 - 0,05 %							
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 - 0,057 %				500-1000 l/ha			
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14		500 -1000 l/ha		Excepto guisante verde	

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-00013		DELTAGRI		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Lima	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Espumadora, Philaenus spumarius												
	Psílidos, Psyllidae	0,03 %	1				1000 l/ha			Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
Limonero	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Espumadora, Philaenus spumarius												
	Psílidos, Psyllidae	0,03 %	1				1000 l/ha			Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
Maíz	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Lepidópteros	0,3 - 0,5 l/ha											
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,5 l/ha	1-3	14			600 l/ha						
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Espumadora, Philaenus spumarius												
	Psílidos, Psyllidae	0,03 %	1				1000 l/ha			Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
Naranja	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Espumadora, Philaenus spumarius												
	Psílidos, Psyllidae	0,03 - 0,05 %											
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae												
	Cochinillas, Coccidae												
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 %	1				1000 l/ha			Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
Nogal	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,03 %					1400 l/ha						
	Lepidópteros	0,05 %	1-2	14			1000 l/ha						
Olivo	Algodón del olivo, tramilla, Euphyllura olivina	0,03 - 0,05 %								Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,03 %								Para generacion ANTOFAGA, efectuar una aplicacion a 0,03%.			
	Caparreta negra, Saissetia oleae												
	Mosca del olivo, Bactrocera oleae									Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae						1000- 1400 l/ha			Para generacion CARPOFAGA, efectuar una aplicacion a 0,05%.			
	Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides												
	Espumadora, Philaenus spumarius	0,05 %	1				1000-1400 l/ha			Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.			
Ornamentales herbáceas	Lepidópteros	0,035 %											
	Áfidos, pulgones, Aphididae												
	Espumadora, Philaenus spumarius												
	Trips	0,05 %					500-1000 l/ha						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %	1-3	7			700 l/ha			Aire libre e invernadero			
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	0,05 %											



Patata	Rosquilla negra, Spodoptera littoralis	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	600 l/ha	
Perejil	Lepidópteros		1-2			
	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,05 %	1-2			
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	700 l/ha	
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %			600-1000 l/ha al aire libre y 600-1400 l/ha en invernadero	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero.
Pimiento	Chinches, heterópteros					(Uso secundario) Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %			600 - 1000 l/ha	
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %	ver cond. esp.		600 - 700 l/ha	Efectuar hasta 3 aplicaciones al aire libre y 4 en invernadero.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	7	300 - 500 l/ha	Aire libre e invernadero
Puerro	Trips				400 - 500 l/ha	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	400-500 l/ha	
Rábano	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Coleópteros					
	Lepidópteros					
	Liriomiza, Liriomyza spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	500-1000 l/ha	Aplicar a la aparición de la plaga en el estadio BBCH 15-48 (desde la 5ª hoja desplegada hasta que se alcanza el 80 % del diámetro esperado de la raíz).
Rúcula	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %				
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-2	14	700 l/ha	
Tabaco	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.					
	Trips	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	14	500-1000 l/ha	
Tomate	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula	0,03 %				Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre
	Chinches, heterópteros					(Uso secundario). Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Lepidópteros	0,05 %				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,07 %			600- 1000 l/ha al aire libre y 600-1400 l/ha en invernadero	
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,3 - 0,5 l/ha	1-3	ver cond. esp.	300- 500 l/ha	Intervalo mínimo entre aplicaciones de 7 días en invernadero y 14 días al aire libre
Toronja, pomelo	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Espumadora, Philaenus spumarius					
	Psílidos, Psyllidae	0,03 - 0,05 %				
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					
	Cochinillas, Coccidae					
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,05 %	1		1000 l/ha	Efectuar una única aplicación a la aparición de la plaga.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Lesiones oculares graves. Categoría 1. Líquidos inflamables. Categoría 3. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
Pictograma	 GHS02 (llama)  GHS05 (corrosión)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H226 -Líquidos y vapores inflamables. H302 -Nocivo en caso de ingestión. H315 -Provoca irritación cutánea. H318 -Provoca lesiones oculares graves. H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P331 -NO provocar el vómito. P338 -Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

SPE 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m. hasta la zona no cultivada o de 10 m. usando boquillas de reducción de deriva de +50% en cultivos leñosos y de 5 m. en el resto de cultivos.

SPE 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 35 m. (30 m. usando boquillas de reducción de deriva de +50%, 15 m. con boquillas de +90%) en frutales, 30 m. (20 m. usando boquillas de reducción de deriva de +50%, 10 m. con boquillas de +90%) en olivo, 20 m. (15 m. usando boquillas de reducción de deriva de +50%) en vid y 5 m. en el resto de cultivos hasta las masas de agua superficial.

Después de la aplicación las abejas deben permanecer en las colmenas por un período de 1 día o estar alejadas de la zona de aplicación al menos 3 Km.



Gestión de Envases

Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo nº CAS: 64742-94-5, mezcla de surfactantes aniónicos y no iónicos nº CAS: 66467-20-7/26264-06-2 y dodecil bencen sulfonato cálcico nº CAS: 26264-06-27104-76-7"

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

No autorizado para jardinería exterior doméstica ni para uso profesional en lugares destinados al público en general.

