

Datos del Producto											
Número de Registro: 24464		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 26/06/2006		Renovación:		Caducidad: 31/07/2028	
Nombre Comercial: WISTER											

Titular	Fabricante
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/ Vía de los Poblados, 3. Parque Empresarial Cristalia. Edif. ONIC 5, 6ª Planta 28033 Madrid (Madrid) ESPAÑA	TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/ Vía de los Poblados, 3. Parque Empresarial Cristalia. Edif. ONIC 5, 6ª Planta 28033 Madrid (Madrid) ESPAÑA

Composición
TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V

Envases
Botellas de HDPE/COEX de 40 ml, 26 mm. Botellas de HDPE/COEX de 1 l, 63 mm, 54,7 mm, 54,4 mm. Garrafa de COEX de 5 l, 54,7 mm, 54,4 mm. Garrafa de HDPE de 20 l, 63 mm. Bidón de PE APM de 200 l, 52,5 mm. Los envases de capacidad superiores a 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ajo	Roya, Puccinia spp.	1 l/ha	Máx. 2	21	400 l/ha	Sólo en aplicación foliar. El uso del producto se limitará a una sola aplicación en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas (BBCH 10) y otra a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar) (BBCH 41).
Cebada	Helminthosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres Oídio de los cereales, Blumeria graminis Roya, Puccinia spp. Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	1 l/ha	Máx. 2	14-21	200-400 l/ha	Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) hasta el inicio de la floración (BBCH 61).
Cebolla	Roya, Puccinia spp.	1 l/ha	Máx. 2	21	400 l/ha	Sólo en aplicación foliar. El uso del producto se limitará a una sola aplicación en la etapa del cultivo de desarrollo de las hojas (BBCH 10) y otra a partir del desarrollo vegetativo de la parte cosechable (cuando la base de la hoja empieza a engrosar) (BBCH 41).
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,6 l/ha	1	-		Aplicar en prefloración mediante pulverización normal de carácter preventivo.
Trigo	Helminthosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres Oídio de los cereales, Blumeria graminis Roya, Puccinia spp. Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	1 l/ha	Máx. 2	14-21	200-400 l/ha	Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) hasta el inicio de la floración (BBCH 61).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Ajo, Cebolla	28
Cebada, Trigo	35
Olivo	NP

Condiciones Generales de Uso

Fungicida Inhibidor de DeMetilación.
Aplicar mediante pulverización normal con tractor.
En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto, asimismo se informará de la probabilidad de aparición de resistencias y se propondrán las estrategias de prevención y manejo de las mismas.

Clase de Usuario

Uso profesional.

