

Datos del Producto			
Número de Registro:	24638	Estado:	☒ Vigente
Fechas		Inscripción:	27/11/2007
		Renovación:	
		Caducidad:	31/07/2028
Nombre Comercial: ERASMUS			
Titular		Fabricante	
ALBAUGH TKI d.o.o.		ALBAUGH EUROPE SARL	
Grajski trg 21		World Trade Center Lausanne. Avenue Gratta-Paille, 2.	
SI-2327 RaE		1018 Lausanne	
ESLOVENIA		SUIZA	
Composición			
TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V			
Envases			
Botella f-HDPE de 250 ml (boca 42 mm). Botella f-HDPE de 1 l (boca 42-50 mm). Garrafas f-HDPE de plástico de 5, 10 y 20 l (boca 42-63 mm).			

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis máxima de 0,5 l/ha (0,25 l/ha para aplicaciones manuales en cultivos > 1 m de altura)
Calabaza	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis máxima de 0,5 l/ha (0,25 l/ha para aplicaciones manuales en cultivos > 1 m de altura)
Cebada	Helminthosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres Oídio de los cereales, Blumeria graminis Rincosporiosis, escaldado de cereales, Rhynchosporium secalis Roya, Puccinia spp. Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici		Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Fusariosis, Fusarium spp.	1 l/ha	Realizar un único tratamiento, durante el periodo de floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum		
Melón	Oídio, Podosphaera fuliginea	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis máxima de 0,5 l/ha (0,25 l/ha para aplicaciones manuales en cultivos > 1 m de altura)
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,06 %	Realizar una aplicación en primavera, antes de la floración, no sobrepasando la dosis máxima de 0,65 l/ha.
Pepino	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis máxima de 0,5 l/ha (0,25 l/ha para aplicaciones manuales en cultivos > 1 m de altura)
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis de 0,5 l/ha.
Tomate	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	0,05 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con intervalo mínimo de 7 días, no sobrepasando la dosis máxima de 0,5 l/ha (0,25 l/ha para aplicaciones manuales en cultivos > 1 m de altura)
Trigo	Oídio de los cereales, Blumeria graminis Roya, Puccinia spp. Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici		Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Fusariosis, Fusarium spp.	1 l/ha	Realizar un único tratamiento, durante el periodo de floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Oídio de la vid, Erysiphe necator	0,04 %	Realizar una aplicación desde la presencia visible de las inflorescencias hasta el inicio del cierre del racimo, no sobrepasando la dosis máxima de 0,4 l/ha.

