

Haba para grano	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Haba verde	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha.
Judía para grano	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Judía verde	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha.
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,0075 %	Solo al aire libre. Realizar una aplicación, con un máximo de 0,075 l/Ha, con un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Maíz	Piral del maíz, O.nubilalis	0,0075 - 0,02 %	
	Taladros del maíz, Sesamia spp.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Cicadélidos, Cicadellidae		
Maíz	Delfácidos, Delphacidae	0,075 - 0,2 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.		
	Chinches, heterópteros		
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
Manzano	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	0,0075 - 0,0125 %	No sobrepasar la dosis de 0,125 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	Espumadora, Neophilaenus campestris		
	Espumadora, Philaenus spumarius		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
Olivo	Glifodes, Margaronia unionalis	0,0075 %	[Uso secundario] Aplicar un máximo de 0,075 l/Ha., antes de la apertura de las flores.
	Espumadora, Philaenus spumarius		
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae		
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata		
Patata	Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.	0,075 - 0,2 l/ha	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	0,0075 - 0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
Peral	Espumadora, Neophilaenus campestris		
	Espumadora, Philaenus spumarius		
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata		
	Psila del peral, Cacopsylla pyri		
Peral	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,0125 %	Aplicar un máximo de 0,125 l/Ha. con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
	Chinches, heterópteros		Uso secundario Aplicar un máximo de 0,125 l/Ha. con un volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha. Máximo 1 aplicación por campaña.
Pimiento	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,015 - 0,02 %	No sobrepasar la dosis de 0,20 l/Ha.
Remolacha azucarera	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,015 %	No sobrepasar la dosis de 0,15 l/Ha. Máximo 2 aplicaciones separadas al menos 15 días.
	Lepidópteros	0,0075 - 0,025 %	Solo al aire libre. Realizar 2 aplicaciones separadas al menos 10 días a una dosis máxima de 0,25 l/ha. Para cultivo en parral o espaldera aplicar dosis de 0,0075-0,015% con un máximo de 0,15 l/Ha.
	Moscas blancas, Aleyrodidae		

