



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

17091

LAMDEX EXTRA

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Algodonero	Oruga del algodonero, Earias insulana	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,48 kg/Ha.
Almendro	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
	Avispilla del almendro, Eurytoma amygdali				
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Espumadora, Neophilaenus campestris				
	Espumadora, Philaenus spumarius				
	Lepidópteros				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.				
	Minador sinuoso, Lyonetia clerkella				
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
	Polilla oriental, Grapholita molesta				
Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,4 - 0,8 %	1	-	Aplicar en pulverización foliar a la dosis de 40-80 g/Hl., o en pulverización-cebo a dosis de 0,4-0,5%, tratando una superficie de 1-2 m2 por árbol, preferentemente en su orientación sur, según la técnica necesaria para este tipo de aplicación.	
Apionabo	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Lepidópteros					
Avellano	Diabló del avellano, Curculio nucum	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 kg/ha
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Lepidópteros				
Avena	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,32 Kg/Ha.
	Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata				
	Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca				
Barbarea	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Lepidópteros					
Berro, mastuerzo	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	(Mastuerzo y otros brotes, solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
	Lepidópteros				
Brécol	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
	Lepidópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae				
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aire libre. Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 kg/ha.
	Lepidópteros				
Bulbos hortícolas	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
	Tefrítidos, Tephritidae				[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
	Áfidos, pulgones, Aphididae				

				17091		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
				LAMDEX EXTRA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
	Lepidópteros						
Calabacín	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Canónigo	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Cebada	Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,32 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Centeno	Garrapatillo del cereal, paulilla, Aelia rostrata Sanpedrito, paulillón, Eurygaster austriaca	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,32 Kg/Ha.		
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %			Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha. Para Lepidópteros defoliadores.		
	Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi						
Cerezo	Serpeta de frutales, Lepidosaphes ulmi	0,4 - 0,5 %	1	-	Sólo en pulverización-cebo, aplicado a razón de 0,1 l/árbol de caldo tratando una superficie de 1-2 m2 preferentemente en su lado sur, según la técnica necesaria para este tipo de aplicación.		
	Mosca de la cereza, Rhagoletis cerasi						
Cítricos	Mosca de la fruta, Ceratitidis capitata	0,4 - 0,5 %	1	-	Sólo en pulverización-cebo, aplicado a razón de 0,1 l/árbol de caldo tratando una superficie de 1-2 m2 preferentemente en su lado sur, según la técnica necesaria para este tipo de aplicación.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Col de Bruselas	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Lepidópteros						
Coliflor	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Colza	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,48 kg/Ha.		
	Tefrítidos, Tephritidae				[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Lepidópteros						
Cucurbitáceas de piel no comestible	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Escarola	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,3 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Espinaca	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,27 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Fresal	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae						

Frutales de hueso	Carpocapsa de las ciruelas, Grapholita funebrana Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella Espumadora, Neophilaenus campestris Espumadora, Philaenus spumarius Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella Polilla oriental, Grapholita molesta	0,04 - 0,08 %			Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata	0,4 - 0,5 %	1	-	Aplicar en pulverización foliar a la dosis de 40-80 g/Hl., o en pulverización-cebo a dosis de 0,4-0,5%, tratando una superficie de 1-2 m2 por árbol, preferentemente en su orientación sur, según la técnica necesaria para este tipo de aplicación.
Frutales de pepita	Áfidos, pulgones, Aphididae Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella Espumadora, Neophilaenus campestris Espumadora, Philaenus spumarius Minador punteado, Phyllonorycter spp. Minador sinuoso, Lyonetia clerkella	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
Grosellero	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Guisante verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
Haba verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Judía verde	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,3 Kg/Ha.
Leguminosas de grano	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.
Lúpulo	Áfidos, pulgones, Aphididae	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1,2 Kg/Ha.
Maíz	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Heliothis, Helicoverpa spp.	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,24 Kg/Ha.
Naranja	Áfidos, pulgones, Aphididae Espumadora, Neophilaenus campestris Espumadora, Philaenus spumarius				
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-	Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1,4 Kg/Ha.

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		17091		LAMDEX EXTRA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Olivo	Glifodes, Margaronia unionalis					[Uso secundario] La aplicación se realizará en el período comprendido entre la recolección de la cosecha y la floración de la siguiente.			
	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,04 - 0,08 %	1	-		La aplicación se realizará en el período comprendido entre la recolección de la cosecha y la floración de la siguiente.			
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana								
	Heliothis, Helicoverpa spp.								
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.			
Patata	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata								
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15		Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,56 kg/Ha.			
Pepinillo	Tefrítidos, Tephritidae					[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.			
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.			
Pepino	Tefrítidos, Tephritidae					[Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.			
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.			
Platanera	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.			
Rábano	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.			
Remolacha azucarera	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Cásida de la remolacha, Cassida vittata								
	Pulguilla de la remolacha, Chaetocnema tibialis	0,04 - 0,06 %	Máx. 2	15		Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 0,36 Kg/Ha.			
Repollo	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-		Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,6 Kg/Ha.			
Rúcula	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros	0,04 - 0,08 %	1	-		(Solo aire libre): Aplicar al inicio de la infestación, con un máximo de 0,8 Kg/Ha.			
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Chinche verde, pudenta, Nezara viridula								
	Lepidópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae	0,04 - 0,08 %	Máx. 2	15		Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.			
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Espumadora, Neophilaenus campestris								

