

Algarrobo	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda. **En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89. **En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 21 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Almendro	Chancro del almendro, Diaporthe amygdali					(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Fusicoccum amygdali (Diaporthe amygdali). Aplicar durante BBCH 00-99.
	Monilia, Monilinia spp.					(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Monilia laxa. Aplicar durante BBCH 01-89.
	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Taphrina deformans. Aplicar durante BBCH 01-69.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Wilsonomyces carpophilus. Aplicar durante BBCH 01-69.
Arándano, mirtilo	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 01-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Arbustos frutales	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye grosellero, arándano,mirtilo y zarzamora. Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda. **En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye grosellero, arándano,mirtilo y zarzamora. Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89. **En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 21 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Cerezo	Lepra del cerezo, Taphrina wiesneri					(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Taphrina deformans (en cerezo:Taphrina wiesneri). Aplicar durante BBCH 01-69.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus		4			(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Wilsonomyces carpophilus. Aplicar durante BBCH 01-69.
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	8	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Monilia laxa. Aplicar durante BBCH 01-89.
Ciruelo	Ciruelas del diablo, lepra del ciruelo, Taphrina pruni					(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Taphrina deformans (en ciruelo: Taphrina pruni). Aplicar durante BBCH 01-69.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus		4			(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Wilsonomyces carpophilus. Aplicar durante BBCH 01-69.
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	8	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor por jerarquía) Eficaz frente a Monilia laxa. Aplicar durante BBCH 01-89.
	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda. **En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea				100 - 1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68–89. **En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea el plazo de seguridad será de 1 día. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)

Endrino	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 01–89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Frutales de cáscara	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	**En tratamientos para Monilia, Monilinia spp. debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 1 día. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pacano, nuez de Pecán. Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata , debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pacano, nuez de Pecán. Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89.
	Chancro del almendro, Diaporthe amygdali	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 3 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Frutales de hueso						Indicado para albaricoquero, cerezo y ciruelo (usos menores por jerarquía) y melocotonero (incluye nectarino e híbridos). Eficaz frente a Fusicoccum amygdali. Aplicar durante BBCH 00-99.
Higuera	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en BBCH 68–89.
						**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 21 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Lima	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89.
						**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 21 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Melocotonero	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					Incluye nectarino e híbridos. Eficaz frente a Taphrina deformans. Aplicar durante BBCH 01-69.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus		4			Incluye nectarino e híbridos. Eficaz frente a Wilsonomyces carpophilus. Aplicar durante BBCH 01-69.
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	8	7 días	500 - 2000 l/ha	Incluye nectarino e híbridos. Eficaz frente a Monilia laxa. Aplicar durante BBCH 01-89.
Membrillero	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea				100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*) (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68–89.
						**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, el plazo de seguridad será de 1 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 01–89.
						**En tratamientos para Monilia, Monilinia spp, el plazo de seguridad será de 1 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-00468		VINTEC		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Níspero, níspero del Japón	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.			
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea				100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)			
	Monilia, Monilinia spp.	0,2 Kg/ha	4	7 días	500 - 2000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68–89.			
Plantaciones tropicales y subtropicales	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	**En tratamientos para Monilia, Monilinia spp. debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 1 día. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)			
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye aguacate, caqui, chirimoyo, kiwi, kiwiberry, kiwiño, mango, kumquat, lichi, platanera, piña Tropical, papaya, chumbera, pitaya, fruta del dragón. Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.			
						**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 1 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)			
Toronja, pomelo	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata		2		100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye aguacate, caqui, chirimoyo, kiwi, kiwiberry, kiwiño, mango, kumquat, lichi, platanera, piña Tropical, papaya, chumbera, pitaya, fruta del dragón. Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89.			
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Podredumbre gris, Botrytis cinerea, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de 21 días. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)			
Vid de mesa	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar en invierno, durante el reposo vegetativo (BBCH 00 - antes del inicio del hinchado de las yemas) y tras la poda.			
Vid de vinificación	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,2 Kg/ha	4	7 días	100 - 1000 l/ha	**En tratamientos para Eutipiosis de la vid, Eutypa lata, debido al momento de aplicación, el plazo de seguridad será de NO PROCEDE. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)			
Vid	Eutipiosis de la vid, Eutypa lata	0,2 Kg/ha	1-2	7 días	100 - 200 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 68-89.			
						Aplicar durante BBCH 68-89.			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)							Aplicar en campo mediante aplicación en pulverización en plantas, esquejes y vid en el lugar. Aplicar durante el período de latencia invernal (BBCH00 – antes del inicio del hinchamiento de las yemas). Aplicación después de la poda).		
Ajo	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Alternativamente se puede aplicar a dosis 0,2 kg/hl de 1 a 4 aplicaciones, en viveros de vid mediante aplicación por drenching o inmersión en raíces y retoños. Aplicar durante el período de injerto (operaciones de reproducción de plantas con esquejes, injertos, plantación, etc).			
Berenjena	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					También valido contra Phaeomoniella chlamydospora y Phaeoacremonium minimum			
Calabacín	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.			
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.			
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea								

Calabaza	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Hortalizas de hoja	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum					(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye berro, mastuerzo, canónigo, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea, brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, espinaca, verdolaga y endibia. Aplicar en pulverización foliar de forma preventiva durante BBCH 21-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye berro, mastuerzo, canónigo, escarola, achicoria (hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbarea, brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, espinaca, verdolaga y endibia. Aplicar en pulverización foliar durante BBCH 21-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Hortalizas del género Brassica	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum					
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye brécol, coliflor, col de Bruselas, repollo, col china, berza, col y colirrábano. Aplicar en pulverización foliar de forma preventiva durante BBCH 21-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Leguminosas verdes (frescas)	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum					
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye judía verde, guisante verde y haba verde. Para producción con vaina y/o sin vaina. Aplicar en pulverización foliar de forma preventiva durante BBCH 21-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Melón	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Ornamentales herbáceas	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en pulverización foliar de forma preventiva durante BBCH 21–89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Pepinillo	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Pepino	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Pimiento	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Incluye pimiento tipo guindilla. Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Sandía	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.
Tallos jóvenes	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum					
	Podredumbre gris, Botrytis cinerea	0,025 - 0,15 Kg/ha	8	5 días	500 - 1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Incluye espárrago, cardo, apio, hinojo, alcachofa, puerro, ajete, ajo tierno, ruibarbo y borraja. Aplicar en pulverización foliar de forma preventiva durante BBCH 21-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Tomate	Podredumbre gris, Botrytis cinerea					
	Sclerotinia spp.	5 - 10 g/Hl	8	5 días	500 - 1500 l/ha	Uso en invernaderos permanentes y túneles transitables. Aplicar entre BBCH 21-89 de forma preventiva, sin superar 0,15 kg/ha.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Se recomienda la adopción de las siguientes medidas de mitigación:

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga y aplicación:

- ☐ Gafas de protección durante la mezcla y carga del producto.
- ☐ Guantes de protección química y frente a microorganismos.
- ☐ Ropa de protección, al menos de tipo 6B, contra partículas sólidas de productos químicos y frente a agentes biológicos.
- ☐ Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.
- ☐ Calzado de uso profesional de material polimérico

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:

- ☐ Guantes de protección química y frente a microorganismos.
- ☐ Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.
- ☐ Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS

- ☐ Guantes de protección química y frente a microorganismos, según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, podrán ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato
- ☐ Ropa de protección tipo 6B: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009 y norma UNE-EN 14126:2004/AC:2006.
- ☐ Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- ☐ Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).
- ☐ Protección respiratoria frente a partículas FFP2: -media máscara filtrante con filtro contra partículas, según norma UNE-EN 140:1999/AC:2000 y UNE-EN 149:2001+A1:2010 o bien -media máscara con filtro para partículas P2 según norma UNE-EN 143:2022.
- ☐ Gafa de protección según norma UNE-EN 166:2002 o UNE-EN ISO 16321-1:2022.
- ☐ Ropa de protección nivel C1, de protección completa, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN 27065: 2017/A1:2019. Alternativamente, se puede usar ropa de protección química, tipo 6, frente a salpicaduras de líquidos, conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

Con respecto a la protección de la salud, VINTEC NO puede considerarse como un producto fitosanitario de bajo riesgo conforme a lo establecido en el art. 47 del Reglamento (CE) nº 1107/2009.

En cumplimiento del artículo 45 y Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores así como distribuidores, cuando corresponda, de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

Para mezclas no clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, se recomienda la notificación voluntaria al INTCF.

En todo caso, para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente la notificación mediante el procedimiento armonizado al INTCF.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

Otras leyendas e indicaciones.

Contiene un microorganismo como sustancia activa. Puede tener potencial de producir reacciones de sensibilización cutánea y/o respiratoria.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; algarrobo, arándano, mirtilo, arbustos frutales, toronja, pomelo, lima, endrino, frutales de cáscara (avellano, nogal pistachero, castaño, pacano/nuez de Pecán), higuera, membrillero, níspero, níspero del Japón, plantaciones tropicales y subtropicales, ajo, calabaza, hortalizas de hoja, hortalizas del género Brassica, leguminosas verdes (frescas), tallos jóvenes y ornamentales herbáceas, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

Condiciones de almacenamiento

P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 4°C.

