

Almendro	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila					Eficaz contra Venturia carpophila (=Clasterosporium carpophilum). Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Avellano	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Pseudomonas sp. y Xanthomonas sp. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Berenjena	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 ml/m2	3	10	10 l/100m²	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en todos los estadios.
Espinacas y similares	Alternaria spp. Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa Colletotrichum spp.					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 11-41. Eficaz contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 11-41.
	Bacteriosis	0,075 - 0,176 ml/m2	1-3	10	5 - 8 l/100m²	Eficaz contra Pseudomonas spp. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 11-41.
Forestales y ornamentales leñosas	Roya, Puccinia spp.	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Frutales de hueso	Abolladura, lepra, Taphrina spp.					
	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Frutales de pepita	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.) Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Pseudomonas spp. y Erwinia amylovara. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.

Granado	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia sp.) Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,12 - 0,21 ml/m2	1	-	9,5 l/100m²	Eficaz contra Wilsonomyces caorpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
Higuera	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.
	Venturia spp.	0,12 - 0,18 ml/m2	1	-	9,5 l/100m²	Eficaz contra moteado (Venturia sp.). Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.
Lechuga y similares	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci Antracnosis, Microdochium panattonianum Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae					
	Bacteriosis	0,075 - 0,176 ml/m2	1-3	10	5 - 8 l/100m²	Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 11-41. Eficaz contra Pseudomonas sp. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 11-41.
Nogal	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Xanthomonas juglandis. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Olivo	Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 31-37.
	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,15 - 0,18 ml/m2	1	-	10 l/100m²	Eficaz contra Spilocaea oleaginae. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 31-37.
Patata	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,09 - 0,176 ml/m2	3	10	6 - 8 l/100m²	Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar en todos los estadios.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes					Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 ml/m2	3	10	6 - 10 l/100m²	Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomona spp. Aplicar con mochila pulverizadora de 5 l. Aplicar en todos los estadios.
	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
Vid de mesa	Bacteriosis	0,09 - 0,18 ml/m2	3	10	6 - 12 l/100m²	Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola					Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.



Vid de vinificación	Bacteriosis	0,09 - 0,18 ml/m2	3	10	6 - 10 l/100m²	Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar con mochila puerizadora de 5 l. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila					Eficaz contra Venturia carpophila (=Clasterosporium carpophilum). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus					Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					
Almendro	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Avellano	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Berenjena	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans					Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadíos.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadíos.
Espinacas y similares	Alternaria spp. Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa Colletotrichum spp.					Aplicar entre BBCH 11-41. Eficaz contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Aplicar entre BBCH 11-41.
	Bacteriosis	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha	Eficaz contra Pseudomonas spp. Aplicar entre BBCH 11-41.
Forestales y ornamentales leñosas	Roya, Puccinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Frutales de hueso	Abolladura, lepra, Taphrina spp.					
	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01044		OLICOBRE 70 SC		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Frutales de pepita	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Eficaz contra Pseudomonas spp. y Erwinia amylovara. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.							
Granado	Venturia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha	Eficaz contra moteado (Venturia sp.). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.							
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.							
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus					Eficaz contra Wilsonomyces caorpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.							
	Monilia, Monilinia spp.					Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.							
Higuera	Venturia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha	Eficaz contra moteado (Venturia sp.). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.							
	Monilia, Monilinia spp.					Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.							
Lechuga y similares	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci Antracnosis, Microdochium panattonianum Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha	Aplicar entre BBCH 11-41.							
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas sp. Aplicar entre BBCH 11-41.							
Nogal	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Eficaz contra Xanthomonas juglandis. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.							
	Monilia, Monilinia spp.					Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.							
Olivo	Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 31-37.							
	Repilo del olivo, Venturia oleaginea					Eficaz contra Spilocaea oleaginae. Aplicar entre BBCH 31-37.							
Patata	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,15 - 0,22 %	3	10	600 - 800 l/ha	Aplicar en todos los estadios.							
Tomate	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.							
	Bacteriosis					Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomona spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.							
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1200 l/ha	Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.							
	Bacteriosis					Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.							
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.							
	Bacteriosis					Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.							
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila													
	Bacteriosis	Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.											

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01044		OLICOBRE 70 SC		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Almendro	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila						Eficaz contra Venturia carpophila (=Clasterosporium carpophilum). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus						Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans												
Almendro	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha		Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
Avellano	Bacteriosis						Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha		Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
Berenjena	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani						Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.						
	Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes												
	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans												
Berenjena	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha		Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomona spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.						
Espinacas y similares	Alternaria spp.						.						
	Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa						Aplicar entre BBCH 11-41.						
	Colletotrichum spp.						Aplicar entre BBCH 11-41.						
	Bacteriosis	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha		Eficaz contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Aplicar entre BBCH 11-41. Eficaz contra Pseudomonas spp. Aplicar entre BBCH 11-41.						
Forestales y ornamentales leñosas	Roya, Puccinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha		Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
Frutales de hueso	Monilia, Monilinia spp.						Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Venturia spp.						Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Bacteriosis						Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Abolladura, lepra, Taphrina spp.						Eficaz contra Taphrina deformans. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha		Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
Frutales de pepita	Monilia, Monilinia spp.						Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Venturia spp.						Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha		Eficaz contra Pseudomonas spp. y Erwinia amylovora. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.						
	Venturia spp.						Eficaz contra moteado (Venturia sp.). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.						
	Bacteriosis						Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.						

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01044		OLICOBRE 70 SC		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Granado	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus							Eficaz contra Wilsonomyces caorpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.	
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha			Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.	
Higuera	Venturia spp.							Eficaz contra moteado (Venturia sp.). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.	
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha			Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.	
Lechuga y similares	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci							Aplicar entre BBCH 11-41.	
	Antracnosis, Microdochium panattonianum							Eficaz contra Bremia lactucae. Aplicar entre BBCH 11-41.	
	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae							Eficaz contra Pseudomonas sp. Aplicar entre BBCH 11-41.	
Nogal	Bacteriosis	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha			Eficaz contra Xanthomonas juglandis. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.	
	Bacteriosis							Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.	
Olivo	Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi							Aplicar entre BBCH 31-37.	
	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha			Eficaz contra Spilocaea oleaginae. Aplicar entre BBCH 31-37.	
Patata	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani								
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,15 - 0,22 %	3	10	600 - 800 l/ha			Aplicar en todos los estadios.	
	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani								
	Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes								
Vid de mesa	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans							Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.	
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha			Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomona spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.	
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola							Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.	
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1200 l/ha			Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.	
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor									
	Bacteriosis							Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.	
	Moteado del melocotonero, Venturia carpophila							Eficaz contra Venturia carpophila (=Clasterosporium carpophilum). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.	
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus							Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.	

Almendro	Abolladura, lepra del melocotonero, Taphrina deformans					
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Avellano	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Berenjena	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans					Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
Espinacas y similares	Alternaria spp. Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa Colletotrichum spp.					Aplicar entre BBCH 11-41.
	Bacteriosis	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha	Eficaz contra antracnosis (Colletotrichum spp.). Aplicar entre BBCH 11-41. Eficaz contra Pseudomonas spp. Aplicar entre BBCH 11-41.
Forestales y ornamentales leñosas	Roya, Puccinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Frutales de hueso	Abolladura, lepra, Taphrina spp.					
	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Frutales de pepita	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Eficaz contra Wilsonomyces carpophilus (=Stigmina carpophila). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Monilia, Monilinia spp.					Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Granado	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Bacteriosis					Eficaz contra Pseudomonas spp. y Erwinia amylovara. Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Higuera	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus					Eficaz contra moteado (Venturia sp.) Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha	Eficaz contra Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
Higuera	Venturia spp.					Eficaz contra Wilsonomyces caorpophilus (=Stigmina carpophila). Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 31-37.
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	950 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar desde finales de invierno hasta BBCH 10.

Lechuga y similares	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci Antracnosis, Microdochium panattonianum Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae					Aplicar entre BBCH 11-41.
	Bacteriosis	0,15 - 0,22 %	1-3	10	500 - 800 l/ha	Eficaz contra Pseudomonas sp. Aplicar entre BBCH 11-41.
Nogal	Bacteriosis					Eficaz contra Xanthomonas juglandis. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
	Monilia, Monilinia spp.	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar entre BBCH 92-00, desde el comienzo de la decoloración de las hojas hasta el comienzo de los brotes.
Olivo	Tuberculosis del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Repilo del olivo, Venturia oleaginea	0,15 - 0,18 %	1	-	1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 31-37. Eficaz contra Spilocaea oleaginae. Aplicar entre BBCH 31-37.
	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	0,15 - 0,22 %	3	10	600 - 800 l/ha	Aplicar en todos los estadios.
Tomate	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans					Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomona spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola					Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1200 l/ha	Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola					Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Agrobacterium spp., Xylophilus ampelinus. Aplicar entre BBCH 13-89, desde pre-floración a cosecha.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Berenjena	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans					Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
Tomate	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes					Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
	Bacteriosis	0,15 - 0,18 %	3	10	600 - 1000 l/ha	Eficaz contra Clavibacter michiganensis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. Dosis: 0,9-1,79 l pf/ha. Aplicar en todos los estadios.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
	Alternaria de las solanáceas, Alternaria solani Antracnosis del tomate, Colletotrichum coccodes					

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del APLICADOR:

USO PROFESIONAL:
Mezcla/carga: se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química tipo 6 o C1, calzado de protección frente a productos químicos, ropa de protección parcial tipo delantal tipo PB3 o PB4 o parcial de nivel C3.

Aplicación:
Al aire libre con tractor, manual con lanza/pistola o mochila y en invernadero manual con mochila: se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química tipo 6 o C1 y calzado de protección frente a productos químicos.

En invernadero manual con lanza/pistola:
Guantes de protección química, ropa de protección química tipo 6 o C1, calzado de protección frente a productos químicos y mascarilla tipo FFP2.

USO NO PROFESIONAL:
Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

Seguridad del TRABAJADOR:

USO PROFESIONAL:
Se deberá utilizar ropa de trabajo o C1.

USO NO PROFESIONAL:
Durante el manejo de los cultivos tratados, se recomienda ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

- Normativa aplicable:
- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
 - Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
 - Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065:2017/A1:2019.
 - Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
 - Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020
 - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).
 - Mascarilla con filtro tipo P2 según norma UNE –EN 143:2021.

- Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
 - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
 - Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
 - No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.



Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Toxicidad aguda (oral). Categoría 4.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H302 -Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de Prudencia	P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

Spe1: Para proteger los organismos del suelo, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga cobre a una dosis anual superior a 4 kg Cu/ha/año.
Para vid (hasta 1100 g Cu/ha), tomate y berenjena (aire libre), lechuga y similares, espinacas y similares y patatas:SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial.
Para vid (más de 1100 g Cu/ha), frutales de pepita, frutales de hueso, almendro, avellano, nogal, higuera, granado, olivo y forestales y ornamentales leñosas:SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial.
SPe8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.
Para todos los usos no aplicar una dosis individual superior a 1250 g Cu/ha.
Para frutales de pepita, frutales de hueso, almendro, avellano, nogal, higuera, granado y forestales y ornamentales leñosas:No aplicar desde el inicio de la caída de hojas hasta que los brotes alcancen cerca del 30% de su longitud final.
Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.





Otras Indicaciones reglamentarias

Otras leyendas e indicaciones:
Autorizado para uso no profesional.
EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.

En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda “autorizado para uso no profesional”, en caracteres preferentemente visibles.

Para el uso no profesional y en aquellas zonas destinadas al uso público en general se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

(*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. Los usos menores figurarán de manera separada en la etiqueta.”

OBSERVACIONES

Debe figurar en la Resolución:
En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.